

服用抗結核菌藥物可以治癒結核病。

結核菌生命力很強。你必須連續服藥數月，才能確保所有結核菌都被殺死。



服用抗結核藥物時，請記住下列事項：

- ⊗ 服藥時要遵照醫生的囑咐。
- ⊗ 不要忘記服藥。你的醫務人員會向你介紹**直接監督服藥療法(簡稱DOT)**。DOT就是指醫務人員看你將藥服下。可以找一個你認為方便的時間和地點來進行DOT。這使你服用抗結核藥這件事變得很容易。
- ⊗ **不要過早停藥。** 儘管服藥後幾周，你或許感到病情有所改善，但結核病隨時會復發。你可能再將結核病傳染給他人。
- ⊗ 應讓醫務人員知道，你正服用**任何**其他藥物。這包括不用處方可以買到的藥物、維生素(維他命)和草藥也應告訴醫務人員。

⊗ 服用抗結核藥物其間，不要喝任何含酒精的飲料，啤酒也不能喝。

⊗ 如果你正在懷孕，餵母乳，服用避孕藥物，請告訴你的醫務人員。

⊗ 如果你除了結核病外還有其他疾病，也應該告訴醫務人員。

✓ 下面幾種抗結核藥物中，哪種是你正在服用的：

_____ 雷米封(異煙)

(Isoniazid)



_____ 利福平(Rifampin)

_____ 彼癆滅()Pyrazinamide (PZA)

_____ 乙胺丁醇(肺敵平)(Ethambutol)

_____ 其他藥物 _____


_____ 其他藥物 _____

_____ 其他藥物 _____

抗結核藥物一般都很安全。

極少數人會有副作用。如果你有下列任何問題，請馬上打電話告知醫務人員，或直接去見醫務人員。

- ▶ 食慾不振
- ▶ 嘔吐
- ▶ 胃痛
- ▶ 惡心
- ▶ 眼睛或皮膚變黃
- ▶ 手指和腳趾有麻刺感
- ▶ 嘴周圍有麻刺或麻木感
- ▶ 視力模糊或視力改變
- ▶ 頭暈
- ▶ 關節疼痛
- ▶ 發熱達三天以上
- ▶ 皮疹
- ▶ 容易出血
- ▶ 容易出現青腫
- ▶ _____
- ▶ _____
- ▶ _____
- ▶ _____
- ▶ _____



如果你在服用利福平，你應該了解下述情況：

- ◆ 你的尿液、唾液和眼淚可能呈橘黃色。
- ◆ 你的隱形眼鏡鏡片可能出現色斑。這會在服藥後很快出現。所以在服用利福平過程中不要戴隱形眼鏡。
- ◆ 你的皮膚會對陽光更敏感。使用防晒油並盡量遮住皮膚，以防日曬。
- ◆ 在服用利福平過程中，口服避孕藥可能效果不佳。女性應該使用其他避孕方法，如避孕套等。

保護你自己、你的家人和你的朋友免受結核病困擾，務必完成抗結核的療程！

如果你有任何問題，請聯絡：



<http://www.vdh.state.va.us/epi/tb>



November 8, 2002

What You Should Know About Taking Tuberculosis Medicines (Chinese)

你應該了解如何



服用抗結核藥物