

結核病藥物治療

須知 ○ 你可能得服用

四到九個月的抗結核藥物。你的醫生會告訴你如何服藥。記住，要詢問你的醫生，了解藥物的副作用。



保護你自己、你的家人和你的朋友免受結核病困擾，務必服完全部所需的抗結核藥物！



www.vdh.state.va.us/epi/tb


Stop TB Infection Before It Makes You Sick (Chinese)

如果你有問題，請聯絡：

VDH VIRGINIA
DEPARTMENT
OF HEALTH
Protecting You and Your Environment
www.vdh.state.va.us


November 8, 2002

制止



結核菌感染

以免病菌使你患病！



什麼是 TB?

"TB" 是結核病的簡稱，英文叫 tuberculosis。TB 能侵害人體各個器官，但最常侵害肺部。

我們怎麼會感染上結核菌的？

有呼吸道結核病的人如果咳嗽、說話、大笑或打噴嚏，就會將微小的結核菌播散到



空氣中。附近的人就有可能將細菌吸進肺內。但結核病不會通過握手、共用茶杯或餐具，共用座廁而傳播。

結核菌能存在你的體內，而不使你發病。你的身體能對抗結核菌使你仍然保持健康。這種情況稱為結核菌感染（**TB infection**）。

有時，你的身體無法對抗結核菌。如果這些細菌使你病倒的話，這就是結核病（**TB disease**）。

如果你患了結核病，就應該看醫生。對症下藥，你會馬上康復。如果不進行治療的話，結核病可能是致命的。

我怎麼知道受到結核菌感染？



如果有結核菌感染的話，皮膚試驗是一種測驗方法。皮膚試驗是在手臂上進行。你的醫務人員會向你解釋皮膚試驗的。

如果在手臂的試驗位置上出現一個小小的凸起，就說明可能是“陽性”。如果醫務人員確認皮

膚試驗為陽性的話，就說明你有結核菌感染。

皮膚試驗結果是“陰性”，但和活動性結核病人接觸較多的話，最好還是再作一次皮膚試驗。



如果我的皮膚試驗是陽性，我應該怎麼辦？

第一步應該是進行胸部 X 光檢查，以便排除患有結核病的可能。

就算 X 光並不顯示你患有結核病，你可能仍然需要服用抗結核藥物，以防你因為結核病而病倒。你的醫生會給你一種或多種藥物，治療結核菌感染。

注意，請務必服用藥物。需要很長時間才能殺死結核菌。