Что следует знать о принятии противоту - беркулезных лекарств

Принятие лекарств для устранения туберкулезных палочек и лечения туберкулеза.

Туберкулезные палочки живучи. Для того чтобы от них избавиться, Вам следует принимать предписанные лекарства в течение многих месяцев. Строго следуйте указаниям медицинского работника. Не забывайте принимать таблетки. Медицинский работник расскажет Вам о системе «**Лечение под наблюдением (ЛПН)**». ЛПН . это метод приема противотуберкулезных таблеток в присутствии медицинского работника.

ЛПН может проводиться в выбранном вами месте и в удобное вам время. ЛПН упрощает процесс лечения.

Не прекращайте курс лечения раньше назначенного срока. Даже если вы почувствовали себя лучше через несколько недель лечения, туберкулез может вернуться, и вы опять станете заражать других. Уведомите медицинского работника о **любых других** принимаемых Вами лекарствах, включая лекарства, витамины и гомеопатические средства, приобретаемые без рецепта.

Принимая лекарства, помните о следующем:

В период принятия противотуберкулезных лекарств избегайте употребления пива, вин и ликеров. Уведомите медицинского работника, если Вы беременны, кормите грудью или принимаете противозачаточные таблетки. Уведомите медицинского работника о других имеющихся у Вас заболеваниях.

К широко распространенным лекарствам от туберкулеза относятся:

- Isoniazid (INH)
- Rifampin
- Pyrazinamide (PZA)
- Ethambutol

Как правило, противотуберкулезные лекарства безопасны.

Немногие пациенты страдают побочными явлениями. Если Вы столкнулись с какими-либо из перечисленных ниже проблем, без замедления сообщите об этом Вашему медицинскому работнику лично или по телефону.

- Потеря аппетита
- Рвота
- Сыпь
- Боль в желудке

• Тошнота
• Желтизна глаз или кожи !
Покалывание в пальцах рук или ног
• Покалывание или онемение в области рта
• Затуманивание или другие изменения зрения
• Головокружение
• Боль в суставах
• Повышенная температура на протяжении 3 и более дней
• Повышенная склонность к кровотечениям
• Повышенная склонность к образованию синяков

Если вы принимаете Rifampin, вы должны знать, что:

• Цвет мочи, слюны или слез может приобрести оранжевый оттенок.
• На мягких контактных линзах могут появиться пятна. Это может произойти **очень быстро**! Не носите мягкие контактные линзы пока принимаете Rifampin.
• Чувствительность кожи к солнцу может повыситься. Пользуйтесь солнцезащитным средством и не подвергайте кожу воздействию солнечных лучей.
• Действенность некоторых противозачаточных средств может быть ослаблено принятием Rifampin. Женщинам, принимающим Rifampin, следует пользоваться дополнительными противозачаточными средствами, такими как презервативы.

Если у Вас есть какие-либо вопросы или опасения, обратитесь к Вашему врачу или медсестре.

Защитите себя, свою семью и друзей от туберкулеза.
Закончите курс лечения!

Text - TB Control and Prevention Program, Division of Disease Prevention, Virginia Department of Health 11/8/02
www.vdh.virginia.gov/epidemiology/DiseasePrevention/Programs/Tuberculosis/index.htm
This work is licensed under the Creative Commons AttributionNonCommercial-NoDerivs License
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/

A **Healthy Roads Media** project
www.healthyroadsmedia..org
What You Should Know About Taking Tuberculosis Medicines – Russian
(Last Reviewed 10/06)