

## أدوية السل عادة آمنة.

أناس قلائل جدا يصابون بأعراض جانبية.

إذا حدثت لك أي من المشاكل المدونة تاليا، يجب عليك أن تتلفن أو تري عامل الرعاية الصحية الخاص بك فوراً:

- ◀ فقدان الشهية
- ◀ قئ
- ◀ ألم بالمعدة
- ◀ غثيان
- ◀ أصفرار في الجلد أو العيون
- ◀ الشعور بوخز خفيف في أصابع اليدين
- ◀ أو القدمين
- ◀ الشعور بوخز خفيف أو خدر (تميل)
- ◀ حول الفم
- ◀ عدم وضوح الرؤية (زغللة) أو تغير
- ◀ بالنظر
- ◀ دوار
- ◀ آلام بالمفاصل
- ◀ حمى لأكثر من ثلاثة أيام
- ◀ طفح جلدي
- ◀ نرف بسهولة
- ◀ حدوث زرقة بالجلد بسهولة
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

تجنب شرب البيرة، النبيذ، أو الكحوليات أثناء تعاطيك أدوية السل

إخبري أخصائي الرعاية الصحية لديك إذا كنت حاملاً، ترضعين، أو تأخذين أقراص منع الحمل.

أخبر عامل الرعاية الصحية إذا كان لديك أي مشاكل صحية غير السل.

## ✓ دواء (أدوية) السل الذي تأخذه:



\_\_\_\_\_ إيزونيازيد (INH) Isoniazid  
\_\_\_\_\_ ريفامبين Rifampin  
\_\_\_\_\_ بيرازيناميد (ب ز ا) Pyrazinamide (PZA)  
\_\_\_\_\_ إيثامبوتول Ethambutol  
\_\_\_\_\_ دواء آخر \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ دواء آخر \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ دواء آخر \_\_\_\_\_

تعاطي الدواء لقتل عصيات السل يمكن أن يشفي مرض السل.

عصيات السل قوية. أنت محتاج أن تأخذ دواء لشهور عديدة للتأكد أن كل عصيات السل قد قضي عليها.

## تذكر الآتي عندما تأخذ أقراص مضادة للسل:

إتبع تعليمات أخصائي الرعاية الصحية لديك لأخذ أقراصك.

تذكر أن تأخذ أقراصك. عامل الرعاية الصحية سوف يحدثك عن

## العلاج المرئي المباشر (DOT)

دوت هو عندما يكون عامل الرعاية الصحية معك حين تأخذ أقراص السل. يمكن أن يتم في وقت مناسب لك. دوت

دوت يسهل عليك أن تأخذ أقراص السل.

لا تتوقف عن أخذ أقراصك سريعاً. حتي إذا بدأت أن تشعر بتحسن خلال أسابيع قليلة. مرض السل يمكنه أن يعاودك ويمكنك أن تنشر العدوي للآخرين مرة أخرى.

إخبر عامل الرعاية الصحية المختص بك إذا كنت تأخذ لأي دواء آخر. هذا يشمل الأدوية، الفيتامينات، و الأعشاب التي تشتريها بدون تذكرة طبية.

# ما يجب عليك أن تعرفه عن



# تعاطي الأدوية المضادة لـ سل

أحم نفسك و عائلتك و  
أصدقائك من السل. أكمل  
علاج السل حتي النهاية

إذا كان لديك أسئلة، من  
فضلك أتصل بـ:

---

---

---

---



**VDH** VIRGINIA  
DEPARTMENT  
OF HEALTH  
Protecting You and Your Environment

<http://www.vdh.virginia.gov/epi/tb>

["What You Should Know About Taking  
Tuberculosis Medicines" - Arabic]  
November 8, 2002

إذا كنت تأخذ ريفامبين،  
يجب أن تعرف أن:

♦ بولك ، لعابك أو دموعك قد تتحول إلي  
اللون البرتقالي.

♦ عدساتك اللاصقة الرخوة قد تتلطيخ  
(يظهر بها بقع). هذا قد يحدث **بسرعة  
كبيرة!** لا تلبس عدسات لاصقة رخوة  
لا عندما تأخذ ريفامبين

♦ جلدك قد يصبح أكثر حساسية للشمس.  
إستخدم غطاء واقى من الشمس و غط  
الجلد الذي قد يتعرض للشمس.

بعض وسائل منع الحمل لا تعمل بنفس

♦ **الكفاءة** عندما تأخذين ريفامبين.  
السيدات  
لا بد أن يستخدموا وسيلة مساعدة  
لمنع  
الحمل أثناء أخذ ريفامبين، مثل الغطاء  
الواقى