

Orientación complementaria para las vacunas requeridas por las escuelas Julio de 2021

Se considera que los niños vacunados de acuerdo con el programa armonizado actual o con los programas de recuperación armonizados (incluido el cumplimiento de todos los requisitos mínimos de edad e intervalo) están debidamente inmunizados para asistir a la escuela*†

Nivel de grado	Antígeno	Necesidades mínimas	Notas	Información de la vacuna		
				Componentes	Marca comercial	
Kínder (KG)	Vacunas de difteria, tétano, tos ferina (DTaP)	4 dosis de DTaP - una al cumplir los 4 años o después	Por lo general, se dan 5 al ingresar al kínder. NOTA: Los niños mayores de 7 años solo necesitarán 3 dosis de la vacuna contra el tétanos si la primera dosis se administró a los 12 meses de edad o más (la Tdap puede administrarse como una de las 3 dosis).	DTaP Tdap Td	Daptacel; Infanrix Adacel; Boostrix ; Tenivac	
	Vacuna contra la poliomielitis (IPV)	4 dosis de DTaP - una al cumplir los 4 años o después	NOTA: No es necesaria una cuarta dosis si la tercera dosis se administró a los 4 años de edad o más y al menos 6 meses después de la dosis anterior. La vacuna trivalente oral contra el poliovirus (OPV) puede aceptarse en lugar de la IPV si está indicada como trivalente (o la dosis se administró antes del 1 de abril de 2016).	IPV	IPOL	
	Vacuna contra la varicela	2 dosis				Varivax
	Vacunas contra el sarampión, paperas y rubéola (MMR)	2 dosis de sarampión y paperas; 1 dosis de rubéola Solo se requiere una dosis de la vacuna que contiene paperas para aquellos que se hubieran inscrito en el kínder antes de 2010.	Por lo general, no es un problema para los niños nacidos en los Estados Unidos ya que generalmente se administran 2 dosis de MMR; los niños nacidos en el extranjero pueden haber recibido vacunas de un solo antígeno.	MMR	M-M-R II	
	Hepatitis B	3 dosis	Si un niño tiene entre 11 y 15 años de edad en el momento de la PRIMERA vacunación, solo se necesitan 2 dosis si se usa la dosis para adultos de Recombivax HB.			Engerix-B; Recombivax HB
	Vacuna contra la hepatitis A (VHA)	2 dosis de la vacuna contra la hepatitis A, la primera dosis se administrará a los 12 meses o más.				Vaqta; Havrix

Nivel de grado	Antígeno	Necesidades mínimas	Notas	Información de la vacuna
----------------	----------	---------------------	-------	--------------------------

Orientación complementaria para las vacunas requeridas por las escuelas

		Julio de 2021		comercial		
No específico de grado Información de la vacuna y combinación de vacunas	Vacuna antineumocócica (PCV)	No es necesario para la entrada al kínder.	Solo se requiere para niños en guarderías o programas de Head Start.		Prevnar 13	
	Vacuna contra Haemophilus influenza tipo b (Hib)	No es necesario para la entrada al kínder.	Solo se requiere para niños en guarderías o programas de Head Start.		ActHIB Hiberix; PedvaxIB	
	Vacuna contra Rotavirus	No es necesario para la entrada al kínder.	Solo se requiere para niños en guarderías o programas de Head Start.		RotaTeq Rotarix	
	Vacunas combinadas (contienen al menos una de las vacunas requeridas para la escuela)				Hepatitis B + Hib	Comvax
					MMR + Varicela	ProQuad (MMRV)
					DTaP + IPV	Kinrix; Quadracel
					DTaP + Hepatitis B + IPV	Pediarix
			(DPaT + VPI + Hib)	Pentacel		
			DTaP + IPV + Hib + Hepatitis B	Vaxelis		

Orientación complementaria para las vacunas requeridas por las escuelas Julio de 2021

Nivel de grado	Antígeno	Necesidades mínimas	Notas	Información de la vacuna	
				Componentes	Marca comercial
Séptimo grado	Vacunas contra el tétanos, difteria y tos ferina (Tdap)	1 dosis de Tdap	Si la vacuna Tdap se ha administrado después de los 7 años, se cumple con el requisito. NOTA: Solo se requiere 1 dosis de Tdap, independientemente del intervalo desde la última dosis de la vacuna que contiene tos ferina.	Tdap	Adacel; Boostrix
	Vacuna meningocócica ACWY (MenACWY)	1 dosis de MenACWY	La primera dosis debe administrarse antes del 7 grado y la dosis final debe administrarse antes del 12 grado. (Ver a continuación).		Menactra Menveo
	Vacuna contra el virus del papiloma humano	2 dosis de VPH	ACIP requiere un total de dos o tres dosis dependiendo de la edad de la primera dosis.		Gardasil 9
12 grado	Vacuna meningocócica ACWY (MenACWY)	1 dosis de MenACWY	La dosis final debe administrarse antes del comienzo del 12 grado. Si recibe la primera dosis a los 16 años o más, la segunda dosis no es necesaria. La vacuna MenACWY (antimeningocócica) no debe administrarse a estudiantes mayores de 22 años, que estén matriculados en el 12º grado.		Menactra Menveo

NOTA: Se permite un período de gracia de 4 días de acuerdo con las recomendaciones actuales para TODOS los antígenos/dosis. La programación actual se pueden encontrar en: <http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/index.html>

† La tabla de edades/intervalos mínimos se puede encontrar en el Apéndice A de The Pink Book:
<http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/index.html>

Para recibir información adicional sobre las vacunas en la edad escolar, consulte el sitio web de la División de Inmunización de VDH
<http://www.vdh.virginia.gov/immunization/requirements/>