

# VACUNAS CONTRA EL COVID-19 disponibles para su uso en los Estados Unidos



- En la actualidad, **hay tres marcas de vacunas contra el COVID-19** disponibles para su uso en los Estados Unidos. Las tres marcas reducirán en gran medida las posibilidades de contraer COVID-19 y garantizarán que, si contraes el virus, los síntomas serán leves o no tendrás síntomas en absoluto.
- La **mejor vacuna es la que esté disponible para ti primero**.
- Continuamos estudiando qué tan bien previenen la propagación de COVID-19 y cuánto tiempo dura la protección. Después de recibir tu vacuna, es importante que sigas usando una mascarilla, cuidando la distancia con los demás y lavándote las manos con frecuencia hasta que haya más personas vacunadas.

Empresas farmacéuticas	Pfizer-BioNTech	Moderna	Johnson & Johnson (Janssen)
<b>Cómo funciona</b>	Entrega material genético (ARNm) que le da instrucciones al cuerpo sobre cómo producir la proteína spike del coronavirus. El sistema inmune reacciona a la proteína spike y construye una defensa contra el virus.	Entrega material genético (ARNm) que le da instrucciones al cuerpo cómo producir la proteína spike del coronavirus. El sistema inmune reacciona a la proteína spike y construye una defensa contra el virus.	Utiliza un virus (adenovirus) que no puede replicarse ni dañar el cuerpo para llevar información a las células sobre cómo producir la proteína spike del coronavirus. El sistema inmune reacciona a la proteína spike y construye una defensa contra el virus.
<b>¿Quiénes pueden recibir esta vacuna?¹</b>	Personas mayores de <b>16 años</b>	Personas mayores de <b>18 años</b>	Personas mayores de <b>18 años</b>
<b>¿Cuántas dosis se necesitan?</b>	<b>Dos dosis</b> , preferentemente separadas por 21 días	<b>Dos dosis</b> , preferentemente separadas por 28 días	<b>Una dosis</b>
<b>¿Cuándo recibo mi segunda dosis?</b>	<b>21 días después de la primera dosis</b>  La segunda dosis se puede administrar hasta 4 días antes de la fecha recomendada y hasta 42 días después de recibir la primera dosis sin que afecte a su eficacia. <sup>2</sup>	<b>28 días después de la primera dosis</b>  La segunda dosis se puede administrar hasta 4 días antes de la fecha recomendada y hasta 42 días después de recibir la primera dosis sin que afecte a su eficacia. <sup>2</sup>	<b>No aplica</b>
<b>¿Cuándo estaré totalmente protegido/a?</b>	<b>14 días</b> tras recibir la segunda dosis	<b>14 días</b> tras recibir la segunda dosis	<b>14 días</b> tras recibir la vacuna
<b>Efectos secundarios comunes tras recibir la vacuna</b>	<b>Reacciones en el lugar donde se aplicó la inyección:</b> dolor, enrojecimiento de la piel e hinchazón  <b>Efectos secundarios comunes:</b> cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, dolor en las articulaciones, fiebre, náuseas, inflamación de los ganglios linfáticos	<b>Reacciones en el lugar donde se aplicó la inyección:</b> dolor, sensibilidad e hinchazón de los ganglios linfáticos en el mismo brazo donde se aplicó la inyección, hinchazón y enrojecimiento  <b>Efectos secundarios comunes:</b> fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor en las articulaciones, escalofríos, náuseas y vómitos y fiebre	<b>Reacciones en el lugar donde se aplicó la inyección:</b> dolor, enrojecimiento de la piel e hinchazón  <b>Efectos secundarios comunes:</b> dolor de cabeza, sensación de mucho cansancio, dolores musculares, náuseas y fiebre
<b>¿Qué debo hacer si no me siento bien?</b>	<p>Recuerda inscribirte en <a href="https://v-safe.cdc.gov">v-safe</a> e informar a los CDC a través de tu teléfono inteligente sobre cualquier efecto secundario que desarrolles tras recibir la vacuna COVID-19.</p> <p>Para reducir el dolor y la incomodidad que sientas en la zona donde recibiste la inyección, aplica un paño limpio, fresco y húmedo sobre el área y mantén tu brazo en movimiento. Para reducir las molestias causadas por la fiebre, bebe mucho líquido, usa ropa fresca y descansa. Si sientes dolor persistente u otras molestias, habla con tu médico sobre la posibilidad de tomar un medicamento de venta libre, como ibuprofeno o paracetamol.</p> <p>En la mayoría de los casos, las molestias causadas por la fiebre o por el dolor o la hinchazón en el brazo donde recibiste la inyección de la dosis de la vacuna contra el COVID-19 duraran pocos días. Ponte en contacto con tu médico o proveedor de atención médica si pasadas las primeras 24 horas el enrojecimiento o la sensibilidad aumentan en el lugar donde te aplicaron la inyección o si sientes preocupación por los efectos secundarios que desarrolles, o si estos no desaparecen después de unos días.</p>		



Notas a pie de página:

1. Las personas con antecedentes de reacción alérgica grave (por ejemplo, anafilaxia) o reacción alérgica inmediata a una dosis anterior de la vacuna contra el COVID-19 o que sufran de una alergia conocida (diagnosticada) a un componente de una vacuna, no deben recibir la vacuna. Habla con tu proveedor de atención médica para analizar tus opciones.
2. Si la segunda dosis se administra fuera de este plazo, consulta con tu proveedor de atención médica.

Obtén más información en [Vaccinate.Virginia.gov](https://Vaccinate.Virginia.gov) o llama al **1-877-829-4682**.

