

منابع رایج سرب

برنامه پیشگیری از مسمومیت با سرب در دوران طفولیت Virginia

قرار گرفتن در معرض سرب اغلب در داخل و اطراف خانه اتفاق می افتد. بزرگسالانی که سرگرمی‌ها و حرفه‌های خاصی دارند نیز می‌توانند ذرات سرب را روی لباس و بوت‌های خود به خانه بیاورند. **لیست زیر شامل برخی از منابع متداول قرار گرفتن در معرض سرب است:**

منابع مصرف شده



- ادویه‌های وارداتی به خصوص:
 - کاری، ماساله، زردچوبه، پودر مرچ سرخ، زیره سبز، گشنیز، دارچین
 - کوبتلی‌کووالی، سوانوری ماریلی، تمر هندی، آجیکا
- دواهای خانگی و لوازم آرایشی خانگی، از جمله:
 - باباوسان، دایو توای، گرتا، آذرکون، فاسارد، پاپلوا، بالی قلیا، کندو
 - سندور، سرمه، کاجل، سورمه
- شربنی و شربنی پوش دار وارداتی

منابع محیطی



- رنگ مبتنی بر سرب
- خاک نزدیک جاده یا خاک نزدیک خانه قدیمی
- آب از پایپ حاوی سرب
- پرده‌های کوچک وینیل
- اسباب بازی‌های وارداتی یا عتیقه طفلانه
- سفال و سرامیک (هر چیزی که از گِل ساخته شده باشد) با لعاب سربی
- جواهرات وارداتی

منابع تفریحی



- سرب یا طعمه ماهیگیری
- مرمی‌ها و ساچمه بزرگ
- شیشه‌های رنگه یا سایر نمای شیشه‌یی
- تزیین اسباب و اثاثیه
- شیشه بری یا ساخت سفال/سرامیک
- تیراندازی هدف در میدان‌های تیراندازی
- جواهرات سازی

منابع شغلی



- نوسازی یا بازسازی ساختمان
- ساخت و ساز یا تخریب
- استخراج معادن یا فلزکاری
- دستورالعمل محدوده تیراندازی
- تولید پلاستیک یا رابر
- فلزکاری یا برش
- تعمیر و ساخت بدنه موتور
- ریختن فلز یا لحیم کاری



اگر فکر می‌کنید طفلتان از طریق هر یک از این منابع در معرض سرب قرار گرفته است، از ارائه‌دهنده مراقبت‌های صحتی او بخواهید که آزمایش سرب خون را بگیرد.

