


የዊንዶው ሕክምና ለሰምባ ነቀርሳ (TB) ከተጋለጡ በኋላ

ወላጆች ማወቅ ያለባቸው



ዕድሜያቸው ከ 5 ዓመት በታች የሆኑ ሕፃናት ከኢንፌክሽን በኋላ በፍጥነት ከባድ በሆነ የTB በሽታ ዓይነት የመጠቃት አደጋ ላይ ናቸው

የዊንዶው ሕክምና የመጀመሪያውን ኢንፌክሽን እና ወደ በሽታ የመዛባትን ሁኔታ ሊከላከል ይችላል

- በሕፃናት ላይ የሚታዩ የTB በሽታ ምልክቶች የሚከተሉትን ሊያካትቱ ይችላሉ:**
- ሳል
 - የሕመም ወይም የድካም ስሜቶች
 - ከባድ ድካም
 - የሚያሳምም
 - ስሜት
 - ክብደት መቀነስ ወይም ቅጥ ያጣ የክብደት መጨመር
 - ትኩሳት
 - በለሊት ማላብ

ልጄ አይሰኚዘድ እንዲወስድ እንዴት ልረዳው እችላለሁ?

- ክረኖች ተሰባብረው ውሃ ውስጥ ሊሟሙ ይችላሉ። ማታ በእንቅልፍ ጊዜ ክረኖችን መስጠት ሊከተል የሚችለውን የሆድ አለመመቻት ሊያስወግድ ይችላል። የተሰበሰበውን ክረን ልጅዎ ሊወዳቸው ከሚችሉት ነገሮች ከሚከተሉት ጋር በትንሹ ይቀላቅሉት:



ልጄ የዊንዶው ሕክምና ከመጀመሩ በፊት መሆን ያለበት ምንድን ነው? ልጅዎ የዊንዶው ሕክምና ከመጀመሩ በፊት፣ የምልክት ማጣሪያ፣ የአካል ምርመራ፣ የደረት ራጂ፣ እና የቆዳ ወይም የደም ምርመራ ለTB ኢንፌክሽን ያደርጉላቸዋል

የልጄ የTB ምርመራ ውጤት ነገሩን ከሆነ ሕክምና ለምን አስፈለገ?

ልጅ ለTB ከተጋለጠ በኋላ በሽታው ፖዘቲቭ ሆኖ በልጁ ላይ ለመታየት ጊዜ ይወስዳል። ዊንዶው ተብሎ የሚጠራው ሕክምና፣ ልጅዎ በእርግጥ በበሽታው የተጠቃ መሆኑ እና አለመሆኑን እስኪረጋገጥ ድረስ መድሐኒቱ ልጅዎን በመጠበቅ የታወቀ ነው። ታዲያ ሕፃናት በፍጥነት አደገኛ ወደሆነው የTB ዓይነት የመሸጋገር እድላቸው እጅግ ከፍተኛ ስለሆነ፣ በወቅቱ እነርሱን መንከባከብ በጣም ጠቃሚ ነው።

ልጄ በ8-10 ዓመታት ውስጥ ሌላ የTB ምርመራ የሚያስፈልገው ለምንድን ነው?

ልጅዎ በበሽታው ተጠቅቶ ከሆነ የልጅዎ ሰውነት በ8-10 ዓመታት ውስጥ ለበሽታው ግብረ መልስ የመስጠት በቂ ጊዜ ይኖረዋል። ሁለተኛው ምርመራ፣ ልጆቹ ሕክምናውን መቀጠል እንዳለባቸው እና እንደሌለባቸው ወይም በበሽታው ያልተጠቁ ከሆነ ሕክምናውን ማቆም እንዳለባቸው ይነግረናል።

ትልቁ ልጄ የዊንዶው ሕክምና የማያስፈልገው ለምንድን ነው?

ከትንንሽቹ ልጆች እና ከሕፃናት አንፃር ሲታይ ትልልቆቹ ልጆች ወደ የከፋ የቲቢ በሽታ በፍጥነት የመሸጋገር እድላቸው ያነሰ ነው።

- ሊያጋጥሙ የሚችሉ የጎንዮሽ ጉዳዮች:**
- መለስተኛ ማቅለሽለሽ/ትውከት/የሆድ
 - አለመመቻት
 - በእጅ ወይም በእግር አካባቢ የቁርጥማት ዓይነት ስሜት
 - - ይህን ለማሻል የልጅዎ ዶክተር ቫይታሚን B6

- የልጅዎን ዶክተር መቼ ነው ሊጠሩት የሚገባ:**
- ልጅዎ በየትኛውም የፊት አካባቢ እብጠት፣ ሽፍታ፣ ወይም ብጉር ነገር ካሳየ ወይም የመተንፈስ ችግር ሲያጋጥመው
 - ልጅዎ ከ24 ሰዓታት በላይ የሚታይ ማቅለሽለሽ/ትውከት ካለበት
 - የልጅዎ ቆዳ ብጫ የመሆን ምልክት ካሳየ ወይም በዓይን ላይ የመንጣት ነገር
 - ከታየ
 - ልጅዎ ቀለሞችን የማየት ወይም የመለየት ችግር ከታየበት