

결핵 노출 후 창 치료 (Window Treatment)

보호자가
알아야 할 사항



5세 이하 어린이는 감염된 후 심각한 형태의 결핵이 빠르게 진행될 위험이 큼니다.

창 치료로 초기 감염 및 질병의 진행을 예방할 수 있습니다.

어린이의 결핵 증상에는 다음이 포함됩니다.

- 기침
- 아프거나 힘이 없음
- 무기력
- 장난기가 줄어들음
- 체중 감소 또는 적절한 체중 증가 없음
- 열
- 식은땀

어떻게 이소니아지드를 먹어야 하나요?

- 알약을 부수거나 녹여서 줄 수 있습니다
- 잠자기 전 약을 먹으면 복통을 줄여줍니다
- 부순 약을 아이가 좋아하는 다음과 같은 음식과 조금 섞어서 줍니다



으깬 바나나



사과 소스



푸딩



요거트

창 치료를 시작하기 전 무엇을 해야 하나요?

창 치료 시작 전 증상 검사, 신체검사, 흉부 엑스레이, 결핵 감염 확인을 위한 피부 또는 혈액 검사를 받습니다.

결핵 검사가 음성일 경우

어떤 약물치료를 추천하나요?

결핵에 노출된 후 양성 반응이 나올 때까지

어느 정도 시간이 소요될 수 있습니다.

창 치료라 불리는 약물치료로 감염 여부가 확실해질 때까지 자녀를 보호할 수 있습니다.

어린이는 심각한 형태의 결핵 질환으로 빠르게 발전할 위험이 높으므로 초기에 예방하는 것이 매우 중요합니다.

왜 8~10주 후에 다시 결핵 검사를 받아야 하나요?

결핵에 감염된 경우 8~10주 후 신체 반응을 확인할 수 있습니다. 두 번째 검사로 치료 지속 여부나 감염되지 않은 경우 치료 중단 여부를 결정할 수 있습니다.

큰아이는 창 치료를 받지 않아도 되는 이유가 무엇인가요?

나이가 더 많은 아이는 어린이와 영아에 비해 심각한 결핵 질환으로 빠르게 진행될 가능성이 적습니다.

예상되는 약한 부작용

- 가벼운 메스꺼움/구토/복통 손이나 발의 따끔거림
- 또는 마비
- 담당 의사가 부작용 완화를 위해 비타민 B6를 처방할 수 있습니다
- 설사

담당 의사에게 연락해야 할 때

- 아이 얼굴에 붓기, 발진 또는 물집이 생기거나 호흡이 곤란한 경우
- 24시간 이상 메스꺼움/구토가 계속되는 경우
- 아이의 피부나 흰자위가 황변하는 경우
- 아이가 색을 구분하지 못하는 경우
- 아이에게 비정상적인 출혈이나 멍이 생긴 경우