


Tratamiento de ventana después de la exposición a la tuberculosis

Lo que los
padres
necesitan saber



Los niños menores de 5 años tienen un alto riesgo de desarrollar rápidamente formas graves de la enfermedad de tuberculosis (TB) después de la infección.

El tratamiento de ventana puede prevenir una infección temprana y el progreso hacia la enfermedad

Los síntomas de la enfermedad de TB en niños pueden incluir:

- Tos
- Sensación de enfermedad o debilidad
- Letargo
- Sin ganas de jugar
- Pérdida de peso o falta de aumento del peso apropiado
- Fiebre
- Sudores nocturnos

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a tomar la isoniazida?

- Las pastillas se pueden triturar y disolver
- Dar las pastillas a la hora de acostarse ayuda a evitar cualquier molestia estomacal
- Mezcle las pastillas trituradas con una pequeña cantidad de comida que le gusta a su hijo, como:



Pure de banano



Jugo de manzana



Pudín



Yogurt

¿Qué debe pasar antes de que mi hijo comience el tratamiento de ventana?

Antes de que su hijo comience el tratamiento de ventana, se le hará un examen de detección de síntomas, examen físico, radiografía del tórax, y una prueba en piel o sangre para la infección de TB.

¿Por qué se recomiendan medicamentos si la prueba de TB de mi hijo es negativa?

Puede tomar tiempo para que una prueba de TB salga positiva después de que un niño haya estado expuesto a la TB. El medicamento, llamado tratamiento de ventana, protege a su hijo hasta que se sepa con certeza si ha sido infectado. Los niños pequeños tienen más probabilidades de progresar rápidamente a formas graves de la enfermedad de TB, por lo que es muy importante protegerlos temprano.

¿Por qué mi hijo necesita otra prueba de TB en 8-10 semanas?

En 8-10 semanas, el cuerpo de su hijo habrá tenido tiempo de responder si ha sido infectado con TB. La segunda prueba nos dirá si necesita continuar con el tratamiento o si no está infectado y puede dejar de tomar los medicamentos.

¿Por qué mi hijo mayor no necesita tratamiento de ventana?

Los niños mayores tienen menos probabilidades de progresar rápidamente a la enfermedad de TB severa que los niños pequeños y los bebés.

Posibles efectos secundarios leves:

- Náusea/vómito/molestia estomacal leve
- Hormigueo o entumecimiento en manos o pies - el médico de su hijo puede recetarle vitamina B6 para ayudar con esto
- Diarrea

Cuándo llamar al médico de su hijo:

- Si su hijo tiene inflamación, sarpullido o ampollas en alguna parte de la cara o tiene dificultad para respirar
- Si su hijo tiene náuseas / vómitos durante más de 24 horas
- Si nota un color amarillento en la piel o el blanco de los ojos de su hijo
- Si su hijo tiene problemas para ver o distinguir los colores
- Si su hijo tiene sangrado o moretones inusuales