

Điều trị Dự phòng Sau Phơi nhiễm Bệnh Lao

Điều phụ huynh cần biết



Trẻ em dưới 5 tuổi có nguy cơ cao hình thành nhanh chóng các dạng bệnh TB nặng sau khi nhiễm khuẩn

Điều trị dự phòng có thể giúp phòng ngừa nhiễm trùng sớm và tiến triển thành bệnh

Các Triệu chứng của bệnh Lao (TB) ở trẻ em có thể bao gồm:

- Ho
- Cảm giác ốm hay yếu
- Lờ đờ
- Giảm hiếu động
- Giảm cân hay thiếu tăng cân
- Sốt
- Đổ mồ hôi đêm

Làm thế nào để tôi giúp con dùng isoniazid?


- Các viên thuốc có thể được nghiền và hòa tan
- Cho trẻ uống thuốc vào giờ đi ngủ giúp tránh bất kỳ khó chịu nào ở bụng
- Hòa tan các viên thuốc đã nghiền với một lượng thức ăn nhỏ mà con quý vị thích như:



Chuối dầm



Nước ép Táo



Bánh Pudding



Sữa chua

Điều gì sẽ xảy ra trước khi con tôi bắt đầu điều trị dự phòng?

Trước khi con quý vị bắt đầu điều trị dự phòng, trẻ sẽ có một buổi khám sàng lọc triệu chứng, khám sức khỏe, chụp x-quang ngực, và xét nghiệm da hay máu để phát hiện nhiễm trùng TB.

Tại sao các loại thuốc lại được khuyến nghị nếu xét nghiệm TB của con tôi là âm tính?

Xét nghiệm TB có thể cần thời gian để thành dương tính sau khi một đứa trẻ phơi nhiễm với TB. Thuốc, gọi là điều trị dự phòng, bảo vệ con quý vị cho đến khi biết chắc chắn là trẻ có bị nhiễm bệnh hay không. Trẻ nhỏ có nguy cơ cao hơn đối với việc tiến triển nhanh chóng thành các dạng bệnh TB nghiêm trọng, vì vậy việc bảo vệ trẻ sớm là rất quan trọng.

Tại sao con tôi cần một xét nghiệm TB khác sau 8-10 tuần?

Sau 8-10 tuần, cơ thể của con quý vị sẽ có đủ thời gian phản ứng nếu trẻ đã bị nhiễm TB. Xét nghiệm thứ hai sẽ cho chúng tôi biết liệu trẻ cần tiếp tục điều trị hay là trẻ không bị nhiễm bệnh và có thể ngừng dùng thuốc.

Tại sao đứa con lớn hơn của tôi không cần điều trị dự phòng?

Trẻ em lớn hơn ít có khả năng nhanh chóng tiến triển thành bệnh TB nghiêm trọng hơn so với trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh.

Các phản ứng phụ nhẹ tiềm tàng:

- Buồn nôn/nôn mửa/khó chịu nhẹ ở bụng
- Nhói hay tê ở bàn tay hay bàn chân - bác sĩ của con quý vị có thể kê toa thuốc vitamin B6 để giảm cảm giác khó chịu này
- Tiêu chảy

Khi nào cần gọi bác sĩ của con quý vị:

- Nếu con quý vị bị sưng, mẩn đỏ hay nổi mụn giộp ở bất kỳ phần nào trên mặt hay khó thở
- Nếu con quý vị bị buồn nôn/nôn mửa trong hơn 24 giờ
- Nếu quý vị nhận thấy da trẻ hay lòng trắng mắt bị vàng
- Nếu con quý vị gặp khó khăn để phân biệt màu
- Nếu con quý vị bị chảy máu hay thâm tím bất thường