

Evaluación de riesgo de tuberculosis (TB) de Virginia

Para uso en personas mayores de 6 años

Primera prueba de los síntomas de TB: Ninguno (si no hay síntomas de TB presentes → Continuar con esta herramienta)

Tos Hemoptisis Fiebre Pérdida de peso Poco apetito Sudores nocturnos

Fatiga Si hay síntomas de tuberculosis → Evaluar para enfermedad de TB activa

Utilice esta herramienta para identificar a las **personas asintomáticas de 6 años en adelante** para las pruebas de infección de TB latente (LTBI)

- La repetición de la prueba solo debe realizarse en personas que previamente dieron negativo y que tienen nuevos factores de riesgo desde la última evaluación
- Una prueba de tuberculina en la piel (TST) negativa o un ensayo de liberación de interferón gamma (IGRA) no descarta la enfermedad de TB activa

Marque las casillas de factores de riesgo correspondientes a continuación.

Se recomienda la prueba de infección por TB si se marca alguno de los riesgos a continuación.

Si el resultado de la prueba de infección por TB es positivo y se descarta la presencia de TB activa, se recomienda el tratamiento de infección por TB.

Nacimiento, viaje o residencia en un país con una tasa elevada de TB \geq 3 meses

- Incluidos países aparte de Estados Unidos (EE.UU.), Canadá, Australia, Nueva Zelanda o países de Europa occidental y del norte
- Se prefiere IGRA sobre el TST para personas no nacidas en los Estados Unidos \geq 2 años
- Los médicos pueden tomar decisiones individuales basadas en la información proporcionada durante la evaluación. Las personas que han viajado a países donde la TB es endémica con fines de turismo médico o de salud durante <3 meses pueden ser consideradas para exámenes de detección adicionales según el riesgo estimado durante la evaluación.

Afecciones médicas que aumentan el riesgo de progresión a la enfermedad de TB

Evidencia radiográfica de TB previamente sanada, bajo peso corporal (10% por debajo del ideal), silicosis, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica o en hemodiálisis, gastrectomía, bypass yeyuno-ileal, trasplante de órgano sólido, cáncer de cabeza y cuello

Inmunosupresión, actual o planificada

Infección por VIH, uso de drogas inyectables, receptor de trasplante de órgano, tratamiento con antagonistas del TNF-alfa (por ejemplo, Infliximab, etanercept, otros), esteroides (equivalente a prednisona \geq 15 mg/día por \geq 1 mes) u otro medicamento inmunosupresor

Contacto cercano con alguien con la enfermedad TB infecciosa en cualquier momento

Ninguno; no se indican pruebas de TB en este momento

Nombre del paciente _____

Nombre del proveedor _____

Fecha de nacimiento _____

Fecha de la evaluación _____

