

ለአደጋ ተጋላጭ ኖት?

1. ይገምግሙ

ከሚከተሉት ውስጥ እርሶን የሚመለከት ካለ የሳንባ ነቀርሳ (ቲቢ) ምርመራ ማድረግ አለብዎ።

እርሶ፤

- ቲቢ በሰፊ የሚገኝባቸው አካባቢዎች ላይ- አፍሪካ፣ ኤሽያን፣ ሜክሲኮን፣ ማዕከላዊ ወይም ደቡብ አሜሪካን፣ ካሪቢያንን እና ምስራቃዊ አውሮፓን ጨምሮ ተወልደው፣ ኖረው(ለ አንደ ወር እና ከዛ በላይ) ወይም ወደ ነዚህ አካባቢዎች በተደጋጋሚ ተጉዘው ከሆነ።
- ከአንድ የሚታይ ወይም ንቁ የቲቢ በሽታ ካለበት ሰው ጋር ጊዜ አሳልፈው ከሆነ
- ለሶስት ሳምንታት ወይም ከዛ በላይ የቆየ ሳል፣ ትኩሳት፣ የ ደረት ህመም፣ የ ክብደት መቀነስ፣ ሌሊት ላይ ማላብ፣ ድካም ወይም የምግብ ፍላጎት መቀነስን ጨምሮ የቲቢ በሽታ ምልክቶች ካሉብዎት፤
- ኤች ኦይ ቪ ህመም ካሉብዎት፣ የ ሰውነት አካል ንቅለ ተከላ ያደረጉ ከሆነ፣ ወይም የሰውነትዎ በሽታ የመከላከል አቅም የሚቀንስ መድሃኒት እየወሰዱ ከሆነ፤
- በመርፌ የሚሰጡ መድሃኒቶች የሚወሰዱ ከሆነ፤
- ብዙ የሰው ሰብስብ ባለባቸው ቦታዎች ላይ፣ ለምሳሌ እንደ የ ቤት አልባ ሰዎች መጠልያዎች፣ የማረሚያ ቦታዎች፣ እና የነርሲንግ ቤቶች ውስጥ የሚሰሩ ወይም የሚኖሩ ከሆነ።



2. ምርመራ

የህመም ስሜት ባይሰማዎትም እንኳን፣ በሰውነትዎ ውስጥ የቲቢ ጀርዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ይህም ማለት LTBI (ድብቅ የቲቢ በሽታ) ሊኖርብዎ ይችላል፣ ከዚህም በተጨማሪ በሚታይ ወይም ንቁ የቲቢ በሽታ የመያዝ አደጋ ውስጥ ሊሆኑ ይችላሉ።


የቲቢ ጀርዎች ሰውነት ውስጥ መኖር አለመኖር ለመለየት የሚያገለግሉ ሁለት ዓይነት ምርመራዎች አሉ፡- የቲቢ የደም ምርመራ እና የቲቢ የቆዳ ምርመራ።



3. ህክምና

የምርመራ ውጤትዎ እውነተኛ (ፖዘቲቭ) ከሆነ፣ የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ የደረት ራጅ እንዲነሱ ያዘታል።

Latent TB (ድብቅ ቲቢ) ካሉብዎት፣ ቤተሰብዎ፣ ጓደኞችዎ እና ማህበረሰብዎ ላይ ተጽእኖ ሊያሳድር በሚችል የሚታይ ወይም ንቁ የቲቢ በሽታ ከመታመምዎ በፊት ራስዎን ለመከላከል የታዘዘልዎትን መድሃኒት መውሰድ አለብዎት።



Latent TB. Active Concern.
Tuberculosis Program