


هل أنت عُرضة للإصابة؟

1. التقييم

يجب أن تخضع لفحص السل إذا انطبق عليك أي مما يلي.

إذا كنت:

- وُلدت أو عشت (لأكثر من شهر) في أماكن ينتشر فيها داء السل النشط أو سافرت كثيراً إليها - بما في ذلك إفريقيا وآسيا والمكسيك وأمريكا الوسطى والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا الشرقية
- خالطت مصاباً بداء السل النشط
- ظهرت عليك أعراض داء السل النشط بما في ذلك السعال الذي يستمر ثلاثة أسابيع أو أكثر أو الحمى أو ألم الصدر أو فقدان الوزن أو التعرق الليلي أو الإرهاق أو انخفاض الشهية
- مصاباً بفيروس نقص المناعة البشرية، أو خضعت لعملية زراعة عضو، أو تتناول دواءً يضعف الجهاز المناعي لديك
- تأخذ أدوية عن طريق الحقن
- تعمل أو تعيش في مكان مختلط كبير، مثل مأوى للمشردين أو منشأة إصلاحية أو دار رعاية



2. الاختبار

حتى إذا لم تكن تشعر بأنك مريض، فلا يزال من الممكن أن تكون حاملاً لجراثيم داء السل في جسمك. هذا يعني أنه يمكن أن تكون مصاباً بعدوى السل الكامن وأن تكون مُعرَّضاً لخطر الإصابة بداء السل النشط.

ثمّة نوعان من الاختبارات يمكنك استخدامهما للكشف عن جراثيم داء السل في الجسم: تحاليل الدم المخصصة للكشف عن داء السل واختبار الجلد المخصص للكشف عن داء السل.



3. العلاج

إذا كانت نتيجة اختبارك إيجابية، فسيطلب مقدم الرعاية الصحية منك الخضوع لتصوير الصدر بالأشعة السينية.

إذا كنت مصاباً بعدوى السل الكامن، فتناول الدواء الموصوف لحماية نفسك من الإصابة بداء السل الذي قد يؤثر في أقاربك وأصدقائك ومجتمعك.



Latent TB. Active Concern.
Tuberculosis Program

