

潜伏性结核感染 (LTBI)

您有风险吗？

1. 评估

如果以下任何一项适用，您应该接受结核病 (TB) 检测。

如果您：
• 出生、居住 (超过一个月) 或经常前往活动性结核病常见的地区，包括非洲、亚洲、墨西哥、中美洲或南美洲、加勒比或东欧；

- 曾与活动性结核病患者一起生活；
- 有活动性结核病症状，包括持续三周或更长时间的咳嗽、发烧、胸痛、体重减轻、盗汗、疲劳或食欲降低；
- 感染艾滋病病毒，接受过器官移植，或服用削弱免疫系统的药物；
- 使用注射毒品；
- 在大型团体环境中工作或生活，例如无家可归者收容所、惩教机构或疗养院。

2. 检测

即使您没有感到不适，您的体内仍然可能有结核病菌。这意味着您可能患有 LTBI，并有发展为活动性结核病的风险。


有两种类型的检测可用于检测体内的结核病菌：结核病血液检测和结核病皮肤试验。



3. 治疗

如果您的检测结果呈阳性，您的医疗保健服务提供者将为您下医嘱做胸部 X 光检查。

如果您患有 LTBI，请服用处方药以保护自己免于患上可能影响您的家人、朋友和社区的活动性结核病。



Latent TB. Active Concern.
Tuberculosis Program