


## ¿ESTÁ EN RIESGO?

### I. Evaluar

Usted debe hacerse una prueba de tuberculosis (TB) si alguna de las siguientes es verdadera.

Si usted:

- nació, vivió (por más de un mes) o ha viajado frecuentemente a lugares en los que la enfermedad de la tuberculosis activa es común, incluyendo África, Asia, México, América Central o del Sur, el Caribe o Europa del Este;
- ha pasado tiempo con alguien con la enfermedad de la tuberculosis activa;
- tiene síntomas de la enfermedad de la tuberculosis activa, que incluyen tos que dura tres semanas o más, fiebre, dolor en el pecho, pérdida de peso, sudoraciones nocturnas, fatiga o disminución del apetito;
- tiene VIH, ha recibido un trasplante de órganos o toma medicamentos que debilitan su sistema inmunitario;
- usa drogas inyectables;
- trabaja o vive en un ámbito grupal grande, como un refugio para personas sin hogar, un centro penitenciario o un hogar de enfermería.



### 2. Analizar

Incluso si no se siente enfermo, aún así puede tener gérmenes de tuberculosis en su cuerpo. Esto significa que podría tener infección por tuberculosis latente y estar en riesgo de desarrollar la enfermedad de la tuberculosis activa.

Existen dos tipos de pruebas que se pueden utilizar para detectar gérmenes de la tuberculosis en el cuerpo: análisis de sangre de tuberculosis y la prueba cutánea de tuberculosis.



### 3. Tratar

Si su prueba es positiva, su proveedor de atención médica le indicará una radiografía.

Si tiene infección por tuberculosis latente, tome el medicamento recetado para protegerse de desarrollar la enfermedad de la tuberculosis activa, que podría afectar a su familia, sus amigos y su comunidad.



Latent TB. Active Concern.  
Tuberculosis Program

