

پټ نري رنځ (TB).

فعاله انديپننه

د ناروغانو لپاره يو لارښود

د نري رنځ برنامه
د Virginia د عامې روغتيا رياست

د دې سرچینې موخه د ناروغ لپاره دا ده چې په پټ نري رنځ د اخته کېدو (LTBI)، د اړونده ناروغۍ د شالید په ګډون، دا څنګه تشخیص کېږي او څنګه یې درملنه کېږي په اړه معلومات چمتو کړي. پداسې حال کې چې دا سرچینه د ټولو ناروغانو لپاره ګټور وي، مور هیله لرو چې دا به په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره ګټور وي چې په LTBI سره تشخیص شوي، هغه کسان چې له نري رنځ (TB) د اخته کېدو په ډیر خطر واقع دي، هغه کسان چې له نري رنځ (TB) سره مخ شوي، هغه کسان چې د لوړ خطر لرونکي TB ساحو کې کار کوي، په بیله بیا د دوی د کورنۍ غړي، ملګري، او نور نږدې اړیکې لرونکي کسان وي.

د لا زیاتو معلوماتو لپاره مهرباني وکړئ زموږ له دې ویب پاڼې لیدنه وکړئ


<https://www.vdh.virginia.gov/tuberculosis/>.

د فعال نري رنځ ککرتيا (LTBI) څه شی دی؟


د فعاله نري رنځ ککرتيا (LTBI) یوه داسې روغتيايي ستونزه ده چې خلک د نري رنځ په باکتریا اخته کيږي خو د فعاله نري رنځ (TB) د ناروغانو په څیر نه ناروغه کيږي. LTBI ځینې وختونه د "ویده نري رنځ (TB)" په نامه هم یاديږي، په دی چې د نري رنځ (TB) باکتریا په بدن کې وي خو غیرفعال وي او وده نه کوي. دا چې د بدن دفاعي سیستم کولی شي د نري رنځ (TB) د باکتریا پر ضد مبارزه وکړي، هغه شخص چې LTBI لري د نري رنځ اړوند کومې نښې نښانې نه لري، د ناروغی احساس نه کوي، او همدارنگه نورو کسانو ته د نري رنځ (TB) باکتریا هم نه خپروي.

نري رنځ (TB) یوه وقلیه کېدونکې او درملنه کېدونکې ناروغی ده چې د *Mycobacterium tuberculosis* (M. tuberculosis) په نوم باکتریا څخه رامنځته کيږي. خو هرڅوک چې په *M. tuberculosis* اخته وي د نري رنځ (TB) ناروغی پکې نه رامنځته کيږي. دا باکتریا زیاتره وختونه په سږو یرغل کوي، خو کیدای شي د بدن په هره حصه یرغل وکړي. نښې نښانې یې نظر دی ته چې د بدن په کومه حصه یرغل کوي توپیر لري. دا نښې نښانې یې کېدای شي تر 3 اوونیو زیات توخی، کمزورتیا، تبه، په شپه کې خوله کیدل، د سینې درد او د توخی په وخت کې وینه راتلل وي. که درملنه یې ونشي نو فعال نري رنځ (TB) د مړینې لامل کیدای شي.

که څه هم له LTBI سره باکتریا غیر فعاله وي، دوی په بدن کې ژوندي پاتی کيږي او که درملنه یې ونه شي کیدای شي چې فعاله شي. کله چې دا پېښه رامنځته شي، کیدای شي تاسو د فعاله نري رنځ (TB) ناروغی ونیسي کوم چې تاسو به ډیر ناروغه کړي. نو دا ډیره اړینه ده چې تاسو LTBI درملنه بشپړه کړئ ترسو چې ځان د فعال نري رنځ (TB) له اخته کیدو څخه وساتئ.



څنگه په LTBI اخته کيږئ؟



کله چې په فعاله نري رنځ (TB) ناروغی اخته کس خبرې، توخی، خندا، سندرې یا هم پرنجی کوي، د نري رنځ (TB) باکتریا ترې د هوا له لارې خپريږي. د نري رنځ (TB) باکتریا په هوا کې خپرېدلې شي او که تاسو د دې پېښې په وخت کې دې کس ته نږدې یاست، تاسو تنفس سره ښايي دا باکتریا واخلئ او په ناروغی اخته شئ.

د فعاله نري رنځ (TB) ناروغی په عام ډول په هغو خلکو کې خپريږي چې هره ورځ له یو بل سره ویني او له یو بل سره نږدې اړیکې لري - لکه د کورنۍ غړي، ملګري، همکاران، یا د ښوونځي ټولګیوال.

که تاسو له متحده ایالاتو څخه بهر زیږیدلی یاست، تاسو ښايي د ماشوم په توګه د Bacille Calmette – Guérin (BCG) واکسین ترلاسه

کړی وي. دا واکسین په نویو زیږېدلو ماشومانو او ځوانو ماشومانو کې د نري رنځ (TB) د جدي ډولونو د پراختیا مخه نیسي. په هرصورت، دا له نري رنځ (TB) څخه د ټول عمر لپاره ساتنه نه کوي. دوهمه برخه وګورئ ترڅو پوه شئ چې تاسو څنگه د نري رنځ (TB) لپاره معاینه کولی شئ حتی که تاسو د ماشوم په توګه د BCG واکسین هم ترلاسه کړی وي.

څوک د فعاله نري رنځ (TB) په ناروغۍ د اخته کېدو په خطر کې دي؟

تاسو له لاندې مواردو څخه نري رنځ
(TB) نه اخلي:

- خواره او څښاک شريکول
- لاس ورکول
- په غېږه کې نيول
- د بيت الخلا له سيتونو نه
کار اخيستل

که څه هم د LTBI سره يوازې 5-10% خلک به د نري رنځ (TB) په فعاله ناروغۍ اخته شي، که چيرې د دوی LTBI درملنه ونه شي. په متحده ايالاتو کې شاوخوا 80% د فعاله نري رنځ (TB) قضيې د LTBI د درملني نه کېدو له امله دي. برسیره پردې، ځينې خلک چې LTBI لري د نورو په پرتله د فعاله TB ناروغۍ د اخته کېدو ډير احتمال لري. هغه خلک چې د فعاله TB ناروغۍ د اخته کېدو خطر يی لوړ دی عموماً په دوه کټگوريو کې راځي:

1. هغه خلک چې په دې وروستيو کې د نري رنځ (TB) باکټريا سره اخته شوي (د څرگنديدو څخه دوه کاله وروسته)؛

2. هغه خلک چې لاندې روغتيايي ستونزې لري، چې د بدن دفاعي سيستم کمزوری کوي:


- په HIV اخته کېدل
- د مخدره توکو کارول، په ځانگړې توگه د پېچکارۍ لرونکو مخدره توکو کارول
- د روماتيزم يا کرون ناروغۍ لپاره ځانگړې درملنه
- د غړو پيوندول
- د پښتورگو جدي ناروغي
- د سر او غاړې سرطان
- د شکر ناروغۍ
- طبي درملني، لکه د کورټيکوسټرايډونو کارول
- د سپرو ناروغي
- د بدن کم وزن

3. رسیره پردې، ماشومان، په ځانگړې توگه هغه ماشومان چې عمر يی له پنځو کلونو څخه کم وي، د فعاله نري رنځ (TB) ناروغۍ د پرمختگ لوړ خطر لري چې يوځل يی اخته شي.

ایا زه بایدد نري رنځ (TB) معاینه وکړم؟

تاسو باید معاینه وکړئ که چېرې:

- تاسو د هغه چا سره وخت تیر کړی چې پیژندل شوی چې د نري رنځ (TB) فعاله ناروغي لري یا فکر کړی چې ناروغي لري؛
- تاسو د فعاله نري رنځ (TB) د ناروغي نښې نښانې لرئ؛
- تاسو په داسې هیواد کې زیږدلي، ژوند کوه، یا هم هغو هیوادونو ته سفر کړی چې هلته د فعاله نري رنځ (TB) ناروغي عامه ده.
- تاسو HIV یا هم کومه بله روغتیايي ستونزه لرئ چې ستاسو د بدن دفاعي سیستم یې کمزوری کړی دی.
- تاسو د سنتي له لارې مخدره توکي کاروئ؛
- تاسو په یو لو ځای کې کار یا ژوند کوی چې هلته د نري رنځ (TB) ناروغي عامه ده، لکه د بی کوره خلکو لپاره سرپناه، اصلاحي مرکزونه او یا مرستونونه.



زه څه ډول د LTBI لپاره تر معایناتو لاندې نیول کېږم؟

د LTBI معاینه کولو لپاره، دوه اختیارونه شتون لري - د نري رنځ (TB) د وینې معاینه او د نري رنځ (TB) د پوستکي معاینه. تاسو کولی شئ له خپل ډاکټر یا د ځایي روغتیايي څانګې څخه د نري رنځ (TB) اړوند د پوستکي یا وینې معاینه وکړئ. ستاسو د روغتیايي پاملرنې چمتو کوونکی به تاسو ته ووايي چې کومه معاینه ستاسو لپاره غوره ده او که تاسو د فعاله نري رنځ (TB) ناروغي یا LTBI سره تشخیص شوي یاست نو باید د تعقیبي پاملرنې لپاره یو پلان ترتیب کړئ.

د نري رنځ (TB) د وینې معاینات

د نري رنځ (TB) د وینې معاینات، چې د انټرفیرون-ګاما ریلیز اسیس (IGRAs) په نوم هم پیژندل کېږي، ستاسو د روغتیايي پاملرنې له چمتو کوونکي سره لیدني ته اړتیا لري. ستاسو د روغتیايي پاملرنې چمتو کوونکی به درڅخه د وینې یوه ساده

نمونه واخلي او هغه به د دې لپاره لابراتوار ته ولېږي ترڅو معلومه کړي چې ایا تاسو د نري رنځ (TB) په باکټریا ککړ شوي یاست او که نه. IGRAs د هغو کسانو لپاره چې د BCG واکسین یې اخیستی دی د نري رنځ (TB) غوره ازموینه ده، او د هغو کسانو لپاره چې د نري رنځ (TB) پوستکي معاینې اړین تعقیبي لیدني لپاره بیرته راستنیدو کې ستونزه لري.

- د IGRAs مثبتې معاینه په دې معنا ده چې تاسو د نري رنځ (TB) په باکټریا باندې اخته یاست. په هر صورت، تاسو به تعقیبي معاینې ته اړتیا ولرئ ترڅو معلومه کړئ چې تاسو LTBI یا د فعاله نري رنځ (TB) ناروغي لرئ.
- د منفي IGRAs معنا دا ده چې ستاسو وینې ازموینې ته عکس العمل نه دی ښودلی او دا چې LTBI او په فعاله نري رنځ (TB) ناروغي د اخته کیدو احتمال نشته.

د نري رنځ (TB) د پوستکي معاینه

د نري رنځ (TB) د ویني معاینې په څېر، د TB پوستکي معاینه یا د تیوبرکولین پوستکي ازموینه (TST) ستاسو د روغتيايي پاملرنې د چمتو کونکي لخوا ترسره کېږي ترڅو معلومه کړي چې تاسو د نري رنځ (TB) په باکتریا باندې اخته شوي یاست که نه. د دې ازموینې لپاره، ستاسو د روغتيايي پاملرنې چمتو کونکي به ستاسو د لاس په بنسټه برخه کې لږ مقدار تیوبرکولین، د آزمایشي پروتین داخل کړي. بیا، د 48-72 ساعتونو وروسته به، تاسو بیرته خپل د روغتيايي پاملرنې چمتو کونکي ته ورشئ ترڅو چیرې چې تیوبرکولین تزریق شوی غبرگون اندازه کړئ. ستاسو د روغتيايي مخیني او د هر ډول عکس العمل اندازه کولو پر اساس یه، ستاسو د روغتيايي پاملرنې چمتو کونکي معلومه کړي چې ایا معاینه مثبتې ده که منفي.


- د مثبت TST معنا دا ده چې تاسو د نري رنځ (TB) په باکتریا باندې اخته یاست. په هر صورت، تاسو به تعقیبي معاینې ته اړتیا ولرئ ترڅو معلومه کړئ چې تاسو LTBI یا د فعاله نري رنځ (TB) ناروغي لرئ.
- د منفي TST معنا دا ده چې ستاسو بدن ازمویني ته عکس العمل نه دی ښودلی او دا چې LTBI او فعاله نري رنځ (TB) ناروغي امکان نه لري.

تعقیبي معاینات

که تاسو په دې وروستیو کې له نري رنځ (TB) سره مخ شوي یاست، تاسو ممکن د مخ کیدو څخه 8-10 اوونۍ وروسته د TB دوهم معاینه ته اړتیا ولرئ، ځکه چې دا ممکن ستاسو د بدن لپاره ډیر ژر وي چې مثبت غبرگون رامینځته کړي. که دویمه معاینه منفي وي، نو تاسو احتمال لرئ چې LTBI یا فعال TB ناروغي ونه لرئ.

که ستاسو IGRA یا TST مثبت وي، ستاسو د روغتيايي پاملرنې چمتو کونکي به اضافي معاینه ته اړتیا ولري ترڅو معلومه کړي چې تاسو LTBI یا فعاله نري رنځ (TB) ناروغي لرئ. په دې کې زیاتره ستاسو په سږو کې د فعاله نري رنځ (TB) د ناروغۍ د نښو نښانو د موندلو لپاره د سینې ایکس رے شامل دي، مگر که تاسو توخې لرئ د بلغم نمونه هم پکې شامل وي. څرنگه چې TB تل ستاسو په سږو کې نه وي، ستاسو د روغتيايي پاملرنې چمتو کونکي ممکن نورې نمونې هم واخلي.

مهرباني وکړئ په یاد ولرئ، په ویرجینیا کې د LTBI او فعاله نري رنځ (TB) ناروغۍ د راپور ورکولو وړ شرایط دي، نو ستاسو د روغتيايي پاملرنې چمتو کونکي به دې ته اړتیا ولري چې مثبتې پایلې ځایي روغتيايي څانګې ته راپور کړي. په هر صورت، د دې معاینې پایلې به پټې پاتې شي، او نه شي کولی چې تاسو له دندې څخه ګوښه کړئ، یا ستاسو د کډوالۍ په حیثیت باندې کوم اغېزه وکړي.



مور پوهیرو چې د LTBI تشخیص کیدای شي خورا لوی خبر وي او تاسو ته ډیری پوښتنې پیدا کړي. مور غواړو تاسو ته ډاډ درکړو چې د **LTBI درملنه کیدی شي** او د LTBI درملنه کولی شي ستاسو د فعال نري رنځ (TB) ناروغی پراختیا مخه ونیسي. په داسې حال کې چې د نري رنځ (TB) فعاله ناروغی درملنه هم کیدی شي، که چیرې وده ومومي، تاسو به ځن ډیر ناروغه احساس کړئ او نورو ته TB خپره کړئ. نو، د LTBI درملنه کولی شي تاسو او ستاسو کورنۍ، ملګري، او همکاران روغ او خوندي وساتي.

د LTBI درملنه څه ډول ترسره کېږي؟

ستاسو د LTBI درملني لپاره څو لارې شتون لري. ستاسو د روغتیايي پاملرنې چمتو کونکی به ستاسو د اوسني روغتیايي حالت او نورو درملو ته په کتلو سره چې تاسو یې اخلئ، له تاسو سره کار وکړي ترڅو د درملني تر ټولو مناسبې لارې معلومی شي.

اوسمهال، د ناروغیو د کنترول او وقایي مرکزونه (CDC) او د نري رنځ د کنترولونکو ملي اتحادیه (NTCA) د لنډ مهاله درملني وړاندیز کوي. دغه لارې تاسو ته اجازه درکوي چې خپله درملنه په درې یا څلورو میاشتو کې ترسره کړئ. که دا لارې مناسبه نه وي، نو ستاسو د روغتیايي خدماتو چمتو کونکی به تاسو ته د شپږو یا نهو میاشتو درملنه درکړي. د درملني لپاره یې لاندې ممکنه لارې شتون لري.



- درې میاشتي لپاره په اونی کې یو ځل isoniazid plus rifampin (3HP)
- څلور میاشتي لپاره ورځنی rifampin (4R)
- درې میاشتي لپاره هره ورځ isoniazid plus rifampin (3HR)
- شپږ یا نهه میاشتي لپاره isoniazid (په ترتیب سره 6H یا 9H)

لکه څنګه چې په تیرو برخو کې یادونه وشوه، ځینې خلک یا د ډلې شته کله چې د ناروغی نه ډک چاپیریال کې واقع شي نو د فعاله نري رنځ (TB) ناروغی د پراختیا لپاره خورا لوړ ګواښ لري. دا ډلې نوي زیږیدلي ماشومان، ماشومان او هغه خلک چې HIV لري. د لوړ ګواښ د موجودیت په خاطر، یادو خلکو ته که چیرې د TB ناروغی نه ډک چاپیریال کې واقع شوي وي درملن په پام کې نیول کېږي، که څه هم د دوی د نري رنځ (TB) ناروغی معاینه منفي وي که چیرې تاسو او یا ستاسو ماشوم له

یادې ډلې څخه دی مهرباني وکړئ خپل د صحي خدمتونو چمتو سره دا موضوع شریکه کړئ.

مونږ پوهیرو چې د LTBI درملنه له نورو باکتریايي ناروغیو څخه لکه سینه او بغل چې ممکن تاسو پرې اخته شوي یاست، زیات وخت نیسي. دا د دی لپاره دی چې د نري رنځ (TB) باکتریا نظر نورو باکتریا ګانو ته ډیر ورو وده کوي، نو همدې لپاره یې درملنه هم ډیر وخت غواړي. البته، د LTBI درملنه نسبت فعاله TB ناروغی ته اسانه ده او ژر تر سره کېږي. په یاد ولرئ د دی لپاره چې د LTBI مخنیوي په فعاله TB ناروغی بدل نه شي یواځینی لاره یې داده چې درملنه هرورمرو په هماغه ډول تعقیب کړی چې ستاسو د روغتیايي پاملرنې چمتو کونکي ته یې ووايست.

زه د LTBI درملني لپاره باید په څه پوه شم؟

ستاسو د درملني په اساس، تاسو باید دوا یا هره وزخ اخلئ یا هم په اوونۍ کې یو ځل. دا خورا مهمه ده چې تاسو خپل درمل په سمه توګه وخورئ لکه څنګه چې ستاسو د روغتیايي پاملرنې چمتو کونکي یې تاسو ته وایي، په سم وخت کې ټول د دوا خورلو او د ټولې دوا خورلو په ګډون. که تاسو یې په سمه توګه وخورئ، دغه دوا د فعاله نري رنځ (TB) ناروغی د پرمختګ مخنیوي کې ډیر ښه کار کوي.

برسېره پردې، درملني لارې ته په کتو سره، تاسو ممکن د خپل درمل د کارولو لپاره د خپل د روغتیايي پاملرنې له چمتو کونکي سره لیدنه وکړئ. دی ته تر نظر لاندې درملنه یا (DOT) وایي. DOT ګټور کیدی شي ځکه چې ستاسو د روغتیايي پاملرنې چمتو کونکي کولی شي پوښتنو ته ځواب ووايي، عکس العملونه ته د حل لارې پیدا کړي، او ډاډ ترلاسه کړي چې تاسو ژر تر ژره خپل درملنه بشپړ کړئ.

ایا درملنه جانبی عوارض لري؟

په داسې حال کې چې ډیری خلک د دې وړتیا لري چې د LTBI درمل خورا ښه برداشت کړي، ځینې عام جانبی عوارض شتون لري. ډیری دا جانبی عوارض لږ تاثیر لري، مگر ځینې ممکن سمډستي طبي پاملرنې ته اړتیا ولري. نظر ستاسو درملني رژیم ته چې ممکن تاسو ته په نظر کې ونیول شي تاسو لاندې حالات تجربه کړئ:

- د خولې د اوبو، ادرار، اوبنکو او نورو بدني مایعاتو نارنجي-سور رنگ - دا نورمال دی او ممکن د وخت په تیریدو سره له مینځه لاړ شي.
- ستریا

که تاسو د درملني په دوران کې جدي جانبی عوارضو سره مخ شوی، ژر تر ژره خپل د روغتیايي پاملرنې له چمتو کونکي سره په اړیکه کې شئ. لاندې موارد یې په جدي جانبی عوارضو کې شامل دي:

- سر گنگسي یا بی حالی
- د اشتها له لاسه ورکول
- د زکام په څیر نښې نښانې (د بیلګې په توګه، تبه، زکام، سر درد، سرخوړی، د عضلاتو درد)
- شدید اسهال یا د روښانه رنگ غایطه مواد
- د ساه لنډی
- د خپګان او بی علاقه گی احساسات
- تبه
- ناڅرګنده وزن کمول
- نسواري پیشاب (د کافي یا کولا رنگ)
- ژیر پوستکي یا سترګي
- د پوستکي حساسیت
- د لاسونو او پښو پرله پسې خارښت یا لرزی احساس کول
- دوامداره ستریا یا ضعف - چې 3 یا ډیرو ورځو دوام ولري
- د معدې درد
- د بدن په اسانۍ سره زخمي یا وینی کیدل
- د بندونو درد
- د زړه بدوالی
- کانګي کول
- خارښت

د LTBI درملني په جریان کې د هورمونونو مخنیوي کوونکي او الکل کارول

که تاسو اوسمهال د هورمونونو مخنیوي ګولۍ اخلئ (د زیږون د کنټرول ګولۍ، امپلانټ، Nuvaring، Patch، Depo Provera، یوازې پروګیسټرون ګولۍ)، مهرباني وکړئ په یاد ولرئ چې د نري رنځ (TB) درمل کولی شي د دغو درملو په ښه کار کولو اغیزه وکړي. مهرباني وکړئ په دې اړه خپل د روغتیايي پاملرنې له چمتو کوونکي سره خبرې وکړئ او د امیندواری مخنیوي لپاره د خنډ میتودونه، لکه کنډوم وکاروئ.

د الکل څښل، لکه بیر، شراب، یا liquor، د نري رنځ (TB) درملو اخیستو پرمهال خطرناک کېدلی شي. مهرباني وکړئ خپل د روغتیايي پاملرنې له چمتو کوونکي سره د الکل هر ډول کارولو په اړه بحث وکړئ.

ولي باید درمل وخورم کله چې خان ناروغ نه احساسوم؟

که څه هم تاسو د ناروغي احساس نه کوئ او نه شئ کولی نورو ته نري رنځ (TB) خپور کړئ، تر هغه چې ستاسو په بدن کې د نري رنځ (TB) باکټریا شتون ولري، دوی د دې توان لري چې تاسو ناروغ کړي. د نري رنځ (TB) باکټریا څخه د خلاصون یواځینی لار د LTBI درملني د بشپړې دورې پوره کول دي.

که زه د خپل LTBI درملو یو وخت تطبیق نه کړم څه به وشي؟

که تاسو د خپل LTBI درملو دوز تطبیق هیر کړئ، نو خپل د روغتیايي پاملرنې چمتو کوونکي ته په راتلونکي ملاقات کې ووايست. ډاډ تر لاسه کړئ چې تاسو اضافي دوز نه اخلئ، ځکه چې په یو وخت کې له وړاندیز شوي دوز څخه د اضافي دوز اخیستل سپارښتنه نه کېږي.

که تاسو د خپل LTBI درمل دوه اوونۍ یا ډیر له لاسه ورکړئ، ژر تر ژره د خپل روغتیايي پاملرنې چمتو کوونکي سره لیدنه وکړئ ترڅو معلومه کړئ چې ستاسو د LTBI درملني پلان سره څنګه پرمخ لاړ شي.

نري رنځ (TB) راتلونکي معاینه به مثبته پاتې شي، تاسو اړتیا نه لرئ په راتلونکي کې د TB معاینه وکړئ. په هر صورت، تل ډاډ ترلاسه کړئ چې د فعاله نري رنځ (TB) ناروغی کومې نښو یا نښانو ته پاملرنه وکړئ چې مخکې یې یادونه وشوه. خپل د روغتیايي پاملرنې له چمتو کونکي سره په تماس کې شئ که چیرې تاسو کې د فعاله نري رنځ (TB) نښې نښانې تېرې کړي وي.



څه به وشي که زه یې درملنه پوره نه کړم؟

که تاسو د LTBI درملني یوه دوره پوره نه کړئ، د نري رنځ (TB) باکتریا به ستاسو په بدن کې پاتې شي او کولای شي چې فعاله نري رنځ (TB) ته پرمختګ وکړي. یو ځل بیا، د فعاله نري رنځ (TB) باکتریا څخه د خلاصون یواځینې لار د LTBI درملني بشپړ دوره پوره کول دي.

وروسته له دی چې زه خپله درملنه پای ته ورسوم څه به وشي؟

وروسته له دی چې تاسو خپل LTBI درملنه سرته ورسوئ، تاسو ته به د درملني د بشپړولو سند ستاسو د روغتیايي پاملرنې د چمتو کونکي له خوا درکړل شي. په دی سند کې به د نري رنځ (TB) معایناتو پایلې، د سښي اکس ری پایلې، د درمل نوم، دوز، موده او ستاسو د صحي خدماتو وړاندې کونکي معلومات شامل وي.

د دي سند په یو محفوظ ځای کې له ساتلو ځان ډاډمن کړئ، د دي لپاره چې دا سند به تاسی د راتلونکي نري رنځ (TB) د معلومات را ټولو په وخت کې ښکاره کړئ. لکه څنګه چې د

د ناروغیو د کنترول او وقایې مرکزونه، د HIV/AIDS، ویروسي زېري، STD، او نري رنځ (TB) د وقایې ملي مرکز. (2014). د نري رنځ [TB] په اړه پوښتنې او ځوابونه. د ناروغیو کنترول او مخنیوي مرکزونه. <https://www.cdc.gov/tb/publications/faqs/pdfs/qa.pdf> د ناروغیو د کنترول او مخنیوي مرکزونه، د HIV/AIDS، ویروسي زېري، STD، او نري رنځ (TB) د مخنیوي ملي مرکز. (2014). نري رنځ (TB): د نري رنځ ناروغی په اړه هغه څه ته چې تاسو یې پوهیدو ته اړتیا لرئ. د ناروغیو د کنترول او مخنیوي مرکزونه. https://www.cdc.gov/tb/publications/pamphlets/tb_infection.pdf

Curry د نري رنځ نړیوال مرکز. (August 2020). د پټ نري رنځ (TB) ککړتیا "ویده TB" [د پاورپاینټ سلاډونه]. Curry د نري رنځ نړیوال مرکز. <https://www.currytbcenter.ucsf.edu/products/tbi-flipbook-patient-education-tool>

Sterling, T.R., Njie, G., Zenner, D., Cohn, D.L., Reves, R., Ahmed, A., Menzies, D., Horsburgh Jr, C.R., Crane, C.M., Burgos, M., LoBue, P., Winston, C.A., & Belknap, R. (2020). په پټ نري رنځ د اخته کېدو د درملنې لپاره لارښوونې: د نري رنځ د کنترولونکو د ملي اتحادیې او CDC اړوند د 2020 کال وړاندیزونه. د ناروغی او مریښې اوونیز راپور (MMWR): وړاندیزونه او راپورونه، 69(No. RR-1), 1-11. DOI: <http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.rr6901a1>

Brown پوهنتون روغتیايي خدمات (2019). د فعاله نري رنځ د ککړتیا اړوند درملنه (LTBI): د Brown د روغتیايي خدماتو د ناروغانو د پوهنې لړۍ د Brown پوهنتون صحي خدمات <https://www.brown.edu/campus-life/health/services/sites/brown.edu.campus-life.health.services/files/LTBI%20Treatment.pdf>

California Department of Public Health. (2018). له نري رنځ (TB) څخه آزاده کالیفورنیا: ستاسو له ناروغانو سره د LTBI په اړه خبرې کول (بالغ ناروغان، د کلیفورنیا د عامې روغتیا ریاست. https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/Latent%20TB%20Starter%20Kit%20for%20Providers/Provider_script_for_LTBI_counseling-adults.pdf

د ناروغیو د کنترول او مخنیوي مرکزونه. (2012). نري رنځ: حقایق ترلاسه کړئ! [بروشر]. https://www.cdc.gov/tb/publications/pamphlets/Tuberculosis_Get_the_facts.pdf

د ناروغیو د کنترول او مخنیوي مرکزونه، د HIV/AIDS، ویروسي زېري، STD، او نري رنځ (TB) د مخنیوي ملي مرکز، د نري رنځ د له منځه وړلو څانګه. (2020). د فعال نري رنځ ککړتیا: د روغتیايي پاملرنې د چمتو کونکي لپاره لارښود. د ناروغیو د کنترول او وقایې مرکزونه. <https://www.cdc.gov/tb/publications/faqs/pdfs/qa.pdf>

یادبنتونه

یادبیتونه

یادبنتونه



Latent TB. Active Concern. Tuberculosis Program

د Virginia د روغتیا ریاست د نری رنځ د برنامې موخه د نری رنځ (TB) مخنیوی، درملنه او له منځه وړل دي ترڅو روغتیا ساتنه وکړي او په Virginia کې د ټولو خلکو هوساینې ته وده ورکړي.

د لا زیاتو معلوماتو لپاره مهرباني وکړئ زموږ له دې ویب پاڼې لیدنه وکړئ
د <https://www.vdh.virginia.gov/tuberculosis> له مور سره د 804-864-7906 یا
tuberculosis@vdh.virginia.gov له لارې اړیکه ونیسئ