

ЛАТЕНТНА ТУБЕРКУЛЬОЗНА ІНФЕКЦІЯ (ЛТІ)


ЧИ ПЕРЕБУВАЄТЕ ВИ У ГРУПІ РИЗИКУ?

1. Оцінювання

Ви повинні зробити аналіз на туберкульоз (ТБ), якщо до вас застосовується будь-що з наведеного нижче.

Якщо ви:

- народилися, жили (більше місяця) або часто подорожували туди, де поширена активна форма туберкульозу, включаючи Африку, Азію, Мексику, Центральну чи Південну Америку, Карибський басейн чи Східну Європу;
- контактували певний час із людиною, що має активну форму туберкульозу;
- маєте симптоми активної форми туберкульозу, включаючи кашель, який триває три тижні або більше, підвищену температуру тіла, біль у грудях, втрату ваги, нічну пітливість, втомлюваність або зниження апетиту;
- маєте ВІЛ, проходили трансплантацію органів або приймаєте ліки, які послаблюють вашу імунну систему;
- вживаєте ін'єкційні наркотики;
- працюєте або живете у великій групі людей, наприклад у притулку для бездомних, виправній колонії чи будинку для літніх осіб.



2. Аналіз

Навіть якщо ви не відчуваєте себе хворими, у вашому організмі все одно можуть бути мікроби туберкульозу. Це означає, що у вас може бути ЛТІ та ризик розвитку активного туберкульозу.

Існує два типи аналізів, які можна використовувати для виявлення мікробів туберкульозу в організмі: аналіз крові на туберкульоз і шкірний тест на туберкульоз.



3. Лікування

Якщо ваш тест позитивний, ваш лікар призначить вам рентген грудної клітини.

Якщо у вас ЛТІ, приймайте призначені ліки, щоб захистити себе від розвитку активної форми туберкульозу, який може вплинути на вашу родину, друзів і суспільство.



Latent TB. Active Concern.
Tuberculosis Program

