

코로나바이러스 감염증(COVID-19) 격리와 분리

추가 질문이 있습니까? 다음 주소로 방문하십시오. www.vdh.virginia.gov/coronavirus/

차이점은 무엇입니까?

분리

코로나바이러스 감염증(COVID-19) 환자와 다른 사람들을 분리하는 것입니다.

분리(isolation) 상태인 사람들은 집에 머물면서 가급적 집안에서 환자와 다른 사람들을 분리해야 합니다.

격리

코로나바이러스 감염증(COVID-19) 보균자와 근거리에서 접촉¹한 사람들과 다른 사람들을 분리하는 것입니다.

격리(quarantine) 중인 사람은 가급적 집에 머물면서 다른 사람들과의 접촉을 제한하고 증상이 생기는 경우 건강 상태를 면밀하게 관찰해야 합니다.

언제 일상 활동을 재개하는 것이 안전합니까?

코로나바이러스 감염증(COVID-19) 증상으로 아팠던 경우

가정 내 분리를 종료하기에 안전한 시기:
증상이 처음 발현된 이후 **10일** 이상 경과한 경우

및

24시간 이상 열이 없었으며(해열제를 복용하지 않음)
또한 질병의 다른 징후가 개선되고 있는 경우

코로나바이러스 감염증(COVID-19) 진단을 받았지만 아프지는 않은 경우

가정 내 분리를 종료하기에 안전한 시기:
양성 결과를 받은 검사를 받은 지 **10일**
이상 경과함

접촉한 사람과 함께 살고 있지 않은 경우

격리를 종료하기에 안전한 시기:
코로나바이러스 감염증(COVID-19) 환자와 마지막으로
접촉한 지 **14일** 이상 경과함

및

건강한 상태를 유지하고 있음

접촉한 사람과 함께 살고 있는 경우

코로나바이러스 감염증(COVID-19) 환자와의 완전한
분리²가 가능한 경우 격리를 종료하기에 안전한 시기:

코로나바이러스 감염증(COVID-19) 환자와 마지막으로
접촉한 지 **14일** 이상 경과하였고 **또한** 건강한
상태를 유지하고 있음

완전한 분리²가 불가능한 경우 코로나바이러스
감염증(COVID-19) 환자가 가정 내 분리를 종료해도
좋다는 허락을 받고 **14일** 이상이 경과하였고
또한 건강한 상태를 유지하는 경우에 격리를
종료해도 안전합니다.

1. 근거리 접촉은 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 환자와 6 피트(약 1.8미터) 거리 내에서 15분 이상 함께 있었거나 환자가 전염성이 있는 동안 환자의 호흡기 분비물(예: 기침 또는 재채기, 컵이나 식기 공유, 입맞추기)에 노출된 것을 의미합니다. 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 환자의 경우 증상이 발생하기 2일 전(또는 증상이 없는 경우 양성 결과가 나온 검사 시기에서 2일 전)부터 분리 중단 기준을 충족할 때까지 전염성이 있는 것으로 간주됩니다.
2. 완전한 분리는 어떠한 접촉도 없고, 같은 공간에서 함께 있지 않으며, 어떠한 공간(침실 및 욕실 포함)도 같이 쓰지 않음을 의미합니다.