

检测 COVID-19

检测期间须知

- 鼻咽 (NP) 拭子用于从鼻子和上喉之间的区域采集样本。
- 这些拭子可用于检测病毒（例如，COVID-19、流感、RSV）和细菌。

检测之前

如果您有以下任何一种情况，请告知检测人员。

- 鼻子或鼻窦有问题
- 最近有鼻部外伤或手术病史
- 正在服用稀释血液的药物
- 有凝血障碍
- 对检测有疑问


去检测现场时需佩戴
口罩。

检测人员将佩戴医用口罩、
手套、防护服和面罩。



检测期间

- 在检测人员让您摘下口罩之前，请始终佩戴口罩。
- 检测人员将用细长的柔性拭子来采集样本。
- 如果可能，将头部向后倾斜。
- 检测人员会将拭子穿过一侧鼻孔，伸向鼻子后部。



- 拭子将在您的鼻子内部停留 10 - 15 秒。检测人员将旋转拭子。
- 如果检测人员没有从您的第一个鼻孔中取出足够的样本，则可能会将拭子放入另一个鼻孔。
- 检测期间，您可能会感到不适，也可能会流泪，但不会感到疼痛。闭上眼睛可以缓解不适。

检测后

- 您的鼻子可能会感觉不舒服。您可能会流鼻血，但这并不常见。
- 如果因为您出现新冠肺炎症状或者与新冠肺炎患者密切接触而进行了检测，在等待结果时应待在家中。在症状显现或检测结果呈阳性（如果没有症状）后，检测结果呈阳性的人员必须在家中呆 10 天。VDH 建议有密切接触但无新冠肺炎症状的人员在最后一次接触后应在家中呆 14 天。如果无法在家中呆 14 天且没有症状，则可以提早离开家：1) 将最后一次密切接触的日期计为第 0 天，未经检测的检疫隔离可能会在第 10 天后结束，2) 如果第 5 天或之后进行阴性 PCR 或抗原检测，则可在第 7 天后结束。如果提早离开家，则应在 14 天内留心观察症状，并始终遵循新冠肺炎预防建议。
- 如果您已从新冠肺炎中康复或已接受了完整的新冠肺炎疫苗接种，则可能无需呆在家中，但仍应在 14 天内监测症状，继续戴口罩并注意自己的社交距离（完整接受了新冠肺炎疫苗接种的人员除外），避免拥挤人群，勤洗手。请访问 www.vdh.virginia.gov/coronavirus/local-exposure/，了解更多信息。