

## ملخص لقاح كوفيد-19

الاختلاف الكبير بين عدد جرعات لقاح كوفيد-19 الموزعة وعدد الجرعات المعطاة متوقع لعدة عوامل. يجري توزيع اللقاح بكميات كبيرة وينبغي بعدها تقديمه في العيادات طوال 7 - 10 أيام تالية. بالإضافة إلى ذلك، ترد التقارير من مقدمي الرعاية الصحية بشأن الجرعات إلى نظام معلومات التطعيم بفيرجينيا (VIIS) لمدة تصل إلى 72 ساعة بعد إعطائها.

**الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل:** يتضمن هذا العدد الأفراد الذين تلقوا جرعة واحدة والأفراد الذين تلقوا جرعتين.

**الأفراد الذين تلقوا جرعات اللقاح كلها:** الأفراد الذين أتموا التسلسل الموصى به لأحد منتجات اللقاحات المحددة (على سبيل المثال، جرعتان من تسلسل لقاح فايزر أو مودرنا على دفعتين)

**إجمالي الجرعات المعطاة:** يمثل هذا العدد إجمالي الجرعات المعطاة للأشخاص في فيرجينيا، بصرف النظر عن كونها جرعة أولى أو جرعة ثانية. وسيزيد هذا العدد عن عدد الأفراد الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل لأن بعض الأشخاص سيكونون قد تلقوا أكثر من جرعة واحدة.

**الجرعات المتلقاة:** الإحصاءات التراكمية لجرعات لقاح كوفيد-19 (مودرنا وفايزر) المسجلة باعتبارها مضمنة في نظام تتبع اللقاحات (VTrckS) لدى مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) منذ 13 ديسمبر، 2020. تتضمن الجرعات المتلقاة اللقاحات المخصصة لبرنامج الشراكة الصيدلانية الفيدرالية مع CDC الموجه إلى منشآت الرعاية الطويلة الأمد.

**ملحوظة:** تتم عملية تلقي لقاح كوفيد-19 أحياناً في خطوتين. سيتلقى الشخص حقنة أو جرعة واحدة من اللقاح، وسيحتاج ذلك الشخص جرعة ثانية من اللقاح بعد 3 - 4 أسابيع. ومن المهم تلقي جرعتي اللقاح على حدٍ سواء، حيث سيساعد ذلك على حماية الأشخاص من الإصابة بكوفيد-19 أو الاعتلال في حالة الإصابة به.