

Algorithm ng VDH para sa Pagsusuri sa Batang may COVID-19 Mga Sintomas o Exposure

[Para lang sa pagsusuri ang algorithm na ito, at hindi dapat gamitin para sa pag-test para sa screening]

PARA SA MGA MAGULANG AT TAGABANTAY



***Kabilang sa mga sintomas** ng COVID-19 ang lagnat ($\geq 100.4^{\circ}\text{F}$) o pangiginig, kapaguran (mas pagod kaysa sa karaniwan), pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, ubo, pagkabara ng ilong o tumutulung sipon, biglaang pagkawala ng panlasa o pang-amoy, pamamaga ng lalamunan, hirap huminga, sakit ng tiyan, pagtatae, pagduduwal o pagsusuka, biglaang pagkawala ng ganang kumain.

May sakit ba ang anak mo na may (mga) sintomas ng COVID-19*?

Mga sintomas na bago o hindi pangkaraniwan para sa bata

Panatilihin sa bahay ang bata. Tumawag sa iyong healthcare provider. Ipaalam sa paaralan.

Mga sintomas na pangkaraniwan para sa bata (hal., allergy, migraine, hika) o bunsod ng natukoy nang sakit (hal., impeksyon sa tainga, strep throat)

Humanap ng paggamot sa karaniwang paraan. Kung may lagnat, manatili sa bahay sa loob hanggang sa 24 na oras nang walang lagnat nang walang iniinom na gamot para sa lagnat.

HINDI

Nagkaroon ba ang bata ng close contact** sa nakalipas na 14 na araw sa taong may COVID-19?

HINDI

OO

Ipadala sa Paaralan at/o Pasilidad na Nag-aalaga sa Bata

PARA SA MGA PAARALAN AT PASILIDAD NA NAG-AALAGA SA BATA



****Ang close contact** ay ang posibleng pagka-expose sa taong may COVID-19. Matuto pa [rito](#). May ilang [eksepsiyon](#) para sa mga estudyante sa K-12.

May (mga) sintomas ba ang bata ng COVID-19* sa paaralan/pasilidad na nag-aalaga sa bata?

Mga sintomas na bago o hindi pangkaraniwan para sa bata

Ibukod mula sa iba. Pauwiin. Kung walang pagsusuri ng doktor, tingnan ang seksyong **Return** sa ibaba.

Ibang paliwanag para sa mga sintomas (hal., pabalik-balik na sakit o natukoy nang sakit)

May lagnat

Pauwiin at manatili sa bahay sa loob hanggang sa 24 na oras nang walang lagnat nang walang iniinom gamot para sa lagnat.

HINDI

Nagkaroon ba ang bata ng close contact** sa nakalipas na 14 na araw sa taong may COVID-19?

HINDI

OO

Ipagpatuloy ang mga Karaniwang Gawain

PARA SA MGA HEALTH-CARE PROVIDER



♦ Pag-test– Tingnan ang mga VDH Testing website ([General](#) at [Healthcare Provider](#)) para sa inirerekomendang panahon ng pag-test at iba pang detalye.

Klinikal na Pagsusuri para sa mga Bata na may Sintomas ng COVID-19* (www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/pediatric-hcp.html)

Sa nakalipas na 14 na araw, may close contact** ba sa taong may o hinihinalang may COVID-19?

HINDI

OO

Test* (at/o klinikal na pagsusuri) para sa COVID-19. [Ibukod](#) sa bahay.

Ibukod/i-quarantine# sa bahay.


Isaalang-alang ang ibang diagnosis. Sa oras na mawala ang mga sintomas at wala nang lagnat ang bata sa loob ng 24 na oras na walang iniinom na gamot para sa lagnat, payagang bumalik sa paaralan/pasilidad na nag-aalaga sa bata.

Negative sa COVID-19

Positive na test o diagnosis sa COVID-19

Negative sa COVID-19 o hindi pa na-test

PAGBALIK SA PAARALAN AT PASILIDAD NA NAG-AALAGA SA BATA



Manatili sa bahay (quarantine) hanggang maging ligtas nang makisalamuha sa iba. May ilang [eksepsiyon](#). Bantayan kung may mga sintomas at laging sundin ang [mga rekomendasyon](#) para sa pag-iwas sa COVID-19.

Kapag walang test o klinikal na pagsusuring ginawa.

May mga sintomas (may close contact** man o wala)

10 araw na pananatili sa bahay. Bumalik kapag walang lagnat sa loob ng 24 na oras na walang iniinom na gamot para sa lagnat. I-quarantine ang mga close contact.*

Walang sintomas pero may close contact**

14 na araw ng quarantine sa bahay.* Kung walang sintomas, bumalik matapos ang Araw 14. Kung magka-sintomas, kailangan ang 10 araw na pagbubukod at i-quarantine ang mga close contact.*

Ibukod sa bahay nang 10 araw matapos magka-sintomas (o petsa ng pag-positibo sa test). I-quarantine ang mga close contact.*

Matapos ang 10 araw na pagbubukod, kung walang lagnat sa loob ng 24 na oras at mawala ang sintomas, pwede nang bumalik ang bata sa paaralan/pasilidad na nag-aalaga sa bata.

Mag-quarantine sa loob ng 14 na araw matapos ma-expose# o magbukod sa loob ng 10 araw matapos magka-sintomas

Kung magka-sintomas, mag-test muli sa lalong madaling panahon. 10 araw na pananatili sa bahay matapos magka-sintomas. I-quarantine ang mga close contact.#

Kung walang sintomas, pwede nang bumalik ang bata sa paaralan at/o pasilidad na nag-aalaga sa bata matapos ang Araw 14.*