

患者信息: EVUSHELD

EVUSHELD 用于预防某些 12 岁及以上人员感染 COVID-19。
EVUSHELD 的供应不受限制。使用 EVUSHELD 需要医嘱或处方。

什么是 EVUSHELD (tixagevimab 与 cilgavimab 的联合包装)?

EVUSHELD 是一种适用于成人和青少年的新药,为符合以下条件的人群预防 COVID-19:

- ▶ 12 岁及以上, 体重至少 88 磅 [40 公斤]
- ▶ 目前未感染 SARS-CoV-2, 且近期与感染 SARS-CoV-2 的人无密切接触
- ▶ 因身体状况而导致免疫系统中度至重度减弱, 接受过免疫抑制药物或治疗, 并可能无法对 COVID-19 疫苗产生足够的免疫反应, 或者
- ▶ 因对 COVID-19 疫苗或 COVID-19 疫苗成分有严重不良反应 (如严重过敏反应) 的历史, 而不符合 COVID-19 疫苗的接种条件。



注意:

对于建议接种疫苗的人群,
EVUSHELD 不能替代疫苗接种



在接受 EVUSHELD 前, 我应该告诉我的医疗保健服务提供者哪些信息?

如果您有以下情况, 请告诉您的医疗保健服务提供者:

- 有任何过敏症
- 血小板数量少, 有出血性疾病, 或正在服用抗凝剂 (以防止血栓)
- 曾犯过心脏病或中风, 有其他心脏问题, 或发生心脏问题的风险较高
- 正在怀孕或备孕
- 正在哺乳期
- 患有任何严重疾病
- 正在服用任何药物 (处方药、非处方药、维生素或草药产品)

我在就诊时会接受怎样的治疗?

- ▶ EVUSHELD 由 tixagevimab 和 cilgavimab 两种药物组成。
- ▶ 您将接受 1 剂 EVUSHELD, 包括 2 次单独注射 (tixagevimab 和 cilgavimab)。
- ▶ EVUSHELD 将由您的医疗保健服务提供者为您给药, 即进行 2 次肌肉注射。该肌肉注射通常依次进行, 每侧臀部各注射 1 次。

注射后, 您的医疗保健服务提供者将观察您 1 小时。有可能会发生过敏反应或心脏问题, 特别是对于有心脏病史的患者。这些反应可能很严重或危及生命。



哪里提供 EVUSHELD? 可在 VDH COVID-19 治疗定位工具上找到 EVUSHELD 的位置。以下链接是 VDH 网站上的交互式地图和汇总表, 可供公众和服务提供者确定弗吉尼亚州治疗点的位值: <https://www.vdh.virginia.gov/mabs/covid-19-treatment-locator/>

EVUSHELD 是免费提供的, 但您的医疗保健服务提供者可能会收取注射费。

更新时间 2022 年 3 月

VDH VIRGINIA
DEPARTMENT
OF HEALTH