

환자 정보: 이부실드(EVUSHELD)

이부실드는 12세 이상 사람들의 코로나19 감염을 예방하는 데 사용됩니다.

이부실드의 공급은 제한되지 않습니다. 이부실드를 접종하려면 처방지시 또는 처방전이 필요합니다.

이부실드(EVUSHELD, 틱사게비맵과 실가비맵의 복합제)는 무엇인가요?

이부실드는 다음과 같은 조건에 해당하는 성인과 청소년을 대상으로 코로나19 예방을 위해 사용하는 새로운 약물입니다.

- ▶ 나이가 12세 이상이며 체중이 88파운드[40kg] 이상인 사람
- ▶ 현재 SARS-CoV-2에 감염되지 않았으며, 최근에 SARS-CoV-2 감염자와 밀접 접촉한 적이 없는 사람
- ▶ 질병으로 인해 중등도 또는 중증으로 면역계가 약하고, 면역억제제를 복용하거나 관련 치료를 받았으며 코로나19 백신에 적절한 면역 반응을 보이지 않을 수 있는 사람
- ▶ 코로나19 백신 또는 코로나19 백신 성분에 대한 중증 부작용(예: 중증 알레르기 반응) 이력으로 인해 코로나19 백신을 접종받을 수 없는 사람.



참고:

이부실드는 백신 접종을 권장받은 사람에게 하는 백신 접종의 대체제가 아닙니다.



이부실드를 접종받기 전에 의료 제공자에게 무엇을 알려 주어야 하나요?

다음과 같은 경우, 의료 제공자에게 해당 정보를 알려 주십시오.

- 알레르기가 있는 경우
- 혈소판 수가 적거나, 출혈성 질환이 있거나, 항응고제를 복용(혈병 예방 목적)하는 경우
- 심근경색이나 뇌졸중을 앓았거나, 기타 심장 질환이 있거나, 심장 사건의 고위험군에 속하는 경우
- 임신한 상태이거나 임신 계획이 있는 경우
- 모유 수유 중인 경우
- 중증 질환이 있는 경우
- 약물(처방약, 일반의약품, 비타민 또는 약초)을 복용 중인 경우

예약 방문 시 접종 절차가 어떻게 되나요?

- ▶ 이부실드는 틱사게비맵(tixagevimab)과 실가비맵(cilgavimab)이라는 두 가지 약물로 구성됩니다.
- ▶ 2가지 주사제(틱사게비맵과 실가비맵)로 구성된 이부실드를 1회 접종받습니다.
- ▶ 의료 제공자는 이부실드의 2가지 주사제를 근육에 투여합니다. 일반적으로 접종자의 한쪽 엉덩이에 1가지 주사제를 교대로 투여합니다.

담당 의료 제공자는 주사제 투여 후 1시간 동안 귀하의 상태를 관찰합니다. 특히 심장 사건 이력이 있는 환자에게 알레르기 반응 또는 심장 사건이 발생할 수 있습니다. 중증이거나 생명이 위험한 반응일 수도 있습니다.



이부실드는 어디에서 찾을 수 있나요?

이부실드가 있는 곳은 VDH 코로나19 치료소 찾기 도구에서 찾을 수 있습니다. 다음 링크는 VDH 웹사이트의 인터랙티브 맵과 요약표이며, 일반인과 의료 제공자는 본 링크를 통해 버지니아 내 치료소를 찾을 수 있습니다. <https://www.vdh.virginia.gov/mabs/covid-19-treatment-locator/>

이부실드는 무료로 제공되지만, 의료 제공자는 접종 수수료를 청구할 수 있습니다.