

معلومات طبية للمرضى: عقار Molnupiravir (مولنوبيرافير)

Molnupiravir قد يقي من دخول المستشفى أو حدوث الوفاة للبالغين المعرضين لخطر شديد للإصابة بعدوى كوفيد-19. يجب تناوله في غضون 5 أيام من بدء ظهور أعراض كوفيد-19.

ما هو عقار Molnupiravir؟

Molnupiravir هو عقار جديد يُستخدم في علاج حالات كوفيد-19 التي تتراوح شدتها من خفيفة إلى متوسطة لدى البالغين (18 عامًا أو أكبر) الذين:

- ▶ ثبتت إيجابية اختبار فيروس كوفيد-19 لديهم
 - ▶ يكونون معرضين لخطر الإصابة الشديدة بعدوى كوفيد-19- بما في ذلك دخول المستشفى وحدث الوفاة، والذين يصعب توفير خيارات علاج كوفيد-19 الأخرى لهم أو كانت غير مناسبة لحالاتهم.
- عقار Molnupiravir هو مضاد فيروسي يتم تناوله بالفم (عن طريق بلع أقراص) لمدة 5 أيام. يجب إكمال دورة العلاج، بغض النظر عن زوال الأعراض.

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تصريح الاستخدام الطارئ (EUA) لإتاحة Molnupiravir في أثناء انتشار جائحة كوفيد-19. وعقار Molnupiravir لم يتم اعتماده من قبل إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة.

أخبر موفر خدمات الرعاية الصحية بما إذا كنت:

- ▶ حاملًا، أو ربما تصبحين حاملًا، أو تقومون بنشاط جنسي مع شريكة قد تحمل.
- ▶ تعاني من أي حساسية
- ▶ تقومين برضاعة صغبر طبيعياً أو تخططين للرضاعة الطبيعية
- ▶ تعاني من أي مرض خطير
- ▶ تتناول أي أدوية (بوصفات طبية أو بدون وصفات طبية أو فيتامينات أو منتجات عشبية)



هل توجد آثار جانبية لعقار Molnupiravir؟

- ▶ Molnupiravir قد يسبب ضررًا بالغًا للأجنة (وذلك بحسب المعلومات الواردة في دراسات أجريت على الحيوانات)
- ▶ قد تحدث ردود فعل تحسسية للأشخاص الذي يتناولون Molnupiravir
- ▶ تشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا:
 - < إسهال
 - < قيء
 - < دوار



أين يمكنني العثور على عقار Molnupiravir؟ يمكن العثور على المواقع التي يتوفر فيها عقار Molnupiravir باستخدام أداة تحديد مواقع علاج كوفيد-19 التابعة لوزارة الصحة في ولاية فيرجينيا. يمثل الرابط خريطة تفاعلية على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة في ولاية فيرجينيا تتيح للجمهور وموفري الخدمات تحديد المواقع العلاجية في ولاية فيرجينيا:
<https://www.vdh.virginia.gov/mabs/covid-19-treatment-locator/>



لا بد من وجود وصفة طبية لكل العلاجات المتاحة.