

# የታካሚ መረጃ፡- ፓክሎቪድ (PAXLOVID)



ፓክሎቪድ (PAXLOVID) በ COVID-19 ለሚመጣ ከባድ ሕመም በከፍተኛ ደረጃ ተጋላጭ ለሆኑ ጎልማሶች በሆስፒታል መተኛትን ወይም ሞትን ሊከላከል ይችላል። የ COVID-19 ምልክቶች መታየት በጀመሩ በ5 ቀናት ውስጥ መወሰድ አለበት።

## ፓክሎቪድ (PAXLOVID) ምንድን ነው?

ፓክሎቪድ (PAXLOVID) አዲስ መድኃኒት ሲሆን ከቀላል እስከ መካከለኛ COVID-19 በሚከተሉት ሰዎች ላይ ለማከም ያገለግላል፡-

- ▶ ዕድሜአቸው 12 ዓመትና ከዚያ በላይ ሆኖ ቢያንስ 88 ፖውንድ የሚመዘኑ
- ▶ የ COVID-19 ቫይረሱ ምርመራ ፖዘቲቭ የምርመራ ውጤት ያላቸው
- ▶ በሆስፒታል መተኛትን እና ሞትን ጨምሮ ለከባድ የ COVID-19 ህመምከፍተኛ ተጋላጭነት ያላቸው

ፓክሎቪድ (PAXLOVID) ለ 5 ቀናት በአፍ (እንክብሎችን በመዋጥ) የሚወሰድ ፀረ-ቫይረስ መድኃኒት ነው። የህመም ምልክቶች መቀነስ ቢያሳዩም እንኳን፣ የሕክምናው ሂደት (መድኃኒቱን መውሰድ) መጠናቀቅ አለበት።

የአሜሪካ የምግብ እና የመድኃኒት አስተዳደር (FDA) ፓክሎቪድ (PAXLOVID) በ COVID-19 ወረርሽኝ ወቅት እንዲገኝ ለማድረግ የአደጋ ጊዜ አጠቃቀም ፈቃድን (EUA) ሰጥቷል። ፓክሎቪድ (PAXLOVID) በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ በ FDA የጸደቀ መድኃኒት አይደለም።




## የሚከተሉት ሁኔታዎች ካሉ-በዎት ለጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ ይናገሩ፡-

- የትኞቹም አይነት አለርጂዎች ካሉ-በዎት
- የኩላሊት ወይም የጉበት በሽታ ካሉ-በዎት
- ነፍስ ጡር ከሆኑ፣ ወደፊት ነፍስ ጡር ሊሆኑ የሚችሉ ከሆነ
- ልጅ እያጠቡ ከሆነ
- የትኞቹም አይነት ከባድ ህመሞች ካሉ-በዎት
- መድኃኒቶችን እየወሰዱ ከሆነ (በሃኪም የታዘዙ፣ ካለማዘዣ የሚወሰዱት፣ ቫይታሚኖች ወይም የእፅዋት ውጤቶች)
- ድብልቅ የሆርሞን የወሊድ መከላከያዎችን እየወሰዱ ከሆነ (ፓክሎቪድ (PAXLOVID) በወሊድ መከላከያ ክሊኖችዎ አሰራር ላይ ተፅዕኖ ሊያሰከትል ይችላል)

## ፓክሎቪድ (PAXLOVID) የጎንዮሽ ጉዳዮች አሉት?

- ▶ ፓክሎቪድ (PAXLOVID) ከሚወሰዱት ሌሎች መድኃኒቶች ጋር መስተጋብር ሊፈጥር ይችላል። ስለ ሁሉም አሁን ስለሚወሰዱት መድኃኒቶች ለሐኪምዎ መናገር አስፈላጊ ነው።
- ▶ ፓክሎቪድ (PAXLOVID) የጉበት ችግሮችን ሊያመጣ ይችላል።
- ▶ ፓክሎቪድ (PAXLOVID) በኤች አይ ቪ መድኃኒቶች ላይ የመቋቋም ሁኔታ መፈጠርን ሊያስከትል ይችላል።
- ▶ ሌሎች የጎንዮሽ ጉዳዮች የሚከተሉትን ያካትታሉ፡-
  - > የተለወጠ የመቅመስ ስሜት
  - > ተቅማጥ
  - > ከፍተኛ የደም ግፊት
  - > የጡንቻ ህመሞች



## ፓክሎቪድን (PAXLOVID) የት ማግኘት እችላለሁ?

ፓክሎቪድ (PAXLOVID) መገኛ ቦታዎች በ VDH የ COVID-19 ሕክምና ጠቋሚ መሳሪያ ላይ ይገኛሉ። ሊንኩ በሽርጂኒያ ውስጥ ህብረተሰቡ እና አቅራቢዎች የህክምና ጣቢያዎችን ወይም ቦታዎችን እንዲያገኙ የሚያስችል በ VDH ድረ-ገጽ ላይ በድረ-ገጽ የተሳሰረ ካርታ (interactive map) ነው።  
<https://www.vdh.virginia.gov/mabs/covid-19-treatment-locator/>



**ለሁሉም ሊገኙ ለሚችሉ መፈውሃች/ሕክምናዎች የሐኪም ማዘዣ ያስፈልጋል።**



ስለ COVID-19 ሕክምናዎች ተጨማሪ መረጃ በ <https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus> ላይ ማግኘት ይችላሉ።

