

患者信息：PAXLOVID



PAXLOVID 可以防止有较高风险出现 COVID-19 重症的成人住院或死亡。必须在出现 COVID-19 症状后 5 天内服用。

什么是 PAXLOVID?

PAXLOVID 是一种新药,用于治疗以下人群的轻度至中度 COVID-19:

- ▶ 12 岁及以上, 体重至少 88 磅
- ▶ COVID-19 病毒检测结果呈阳性
- ▶ 出现 **COVID-19 重症** 的风险很高, 包括住院和死亡

PAXLOVID 通过口服(吞服药丸)给药, 为期 5 天。无论症状是否缓解, 都应完成整个疗程

美国食品和药品管理局 (FDA) 已发布紧急使用授权 (EUA), 以便在 COVID-19 疫情期间提供 PAXLOVID。PAXLOVID 在美国并非 FDA 批准的药物。




如果您有以下情况, 请告诉您的医疗保健服务提供者:

- 有任何过敏症
- 患有肾病或肝病
- 正在怀孕, 或可能怀孕
- 正在哺乳期
- 患有任何严重疾病
- 正在服用任何药物(处方药、非处方药、维生素或草药产品)
- 正在服用复方激素避孕药 (PAXLOVID 可能会影响避孕药的作用)

PAXLOVID 有副作用吗?

- ▶ PAXLOVID 可能与您正在服用的其他药物发生相互作用。告诉医生您目前使用的所有药物非常重要。
- ▶ PAXLOVID 可能会导致肝脏问题。
- ▶ PAXLOVID 可能导致对 HIV 药物的耐药性。
- ▶ 其他可能的副作用包括:
 - > 味觉改变
 - > 腹泻
 - > 高血压
 - > 肌肉酸痛



哪里提供 PAXLOVID? 可在 VDH COVID-19 治疗定位工具上找到 PAXLOVID 的位置。以下链接是 VDH 网站上的交互式地图, 可供公众和服务提供者确定弗吉尼亚州的治疗点的位值: <https://www.vdh.virginia.gov/mabs/covid-19-treatment-locator/>



所有可用的治疗方法都需要提供处方。



您可以在以下网址找到关于治疗 COVID-19 的更多信息: <https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus>

