

معلومات مریض: PAXLOVID

PAXLOVID ممکن است از بستر شدن در شفاخانه یا مرگ کلانسالانی که در معرض خطر بلند مریضی شدید کووید-19 قرار دارند، جلوگیری نماید. این دوا باید ظرف 5 روز پس از شروع علائم کووید-19 مصرف شود.

PAXLOVID چیست؟

PAXLOVID دواي نو است که منحيث تداوی کووید-19 خفيف تا متوسط در افرادی مصرف میشود که:

- دارای سن 12 سال و کلانتر از آن با وزن حداقل 88 پوند باشند
 - نتیجه تست ویروس کووید-19 شان مثبت باشد
 - در خطر بلند کووید-19 - شدید بشمول بستری شدن در شفاخانه و مرگ قرار داشته باشند
- PAXLOVID دوايي است که به مدت 5 روز از طریق دهان (با بلعیدن قرص) مصرف میشود. دوره تداوی باید بدون توجه به از بین رفتن علائم تکمیل شود.
- اداره غذا و دوا ایالات متحده (FDA) اجازه استفاده اضطراری (EUA) را جهت قابل دسترس بودن PAXLOVID در جریان همه گیری COVID-19 صادر کرده است. PAXLOVID یک دواي تائید شده از سوی FDA در ایالات متحده نمیباشد.



به ارائه دهنده مراقبت های صحی خود بگوئید در صورتیکه شما:

- کدام نوع حساسیت دارید
- مریضی کرده یا جگر دارید
- حامله استید، یا حامله میشوید
- به طفل شیر میدهند
- هرگونه مریضی جدی دارید
- هرگونه دواهای (با نسخه، بدون نسخه، ویتامین ها یا محصولات گیاهی) مصرف میکنید
- در صورتیکه دواهای ضد حاملگی ترکیبی هورمونی مصرف میکنید (PAXLOVID ممکن است روی عملکرد قرص های ضد حاملگی شما تأثیر بگذارد)



آیا PAXLOVID عوارض جانبی دارد؟

- PAXLOVID ممکن است با دواهای سائری که مصرف میکنید تداخل داشته باشد. مهم است که درمورد تمام دواهای فعلی تان با داکتر تان گپ و گفت بزنید.
- PAXLOVID ممکن است باعث مشکلات جگر شود.
- PAXLOVID ممکن است باعث مقاومت در برابر دواهای HIV شود.
- سائر عوارض جانبی احتمالی عبارت اند از:
 - تغییر مزه دهن
 - اسهال
 - فشار بلند خون
 - درد عضله



در کجا میتوانم PAXLOVID را پیدا کنم؟

موقعیت های مولنوپیراویر PAXLOVID را میتوانید در وسایل موقعیت یاب تداوی کووید-19 VDH پیدا کنید. این لینک یک نقشه تعاملی و جداول خلاصه در وب سایت VDH است که به مردم عامه و ارائه دهندگان اجازه میدهد موقعیت های تداوی در ویرجینیا را پیدا کنند:

<https://www.vdh.virginia.gov/mabs/covid-19-treatment-locator/>



منحيث تمام تداوی های موجود، نسخه ضرور است.