환자 정보: 팍스로비드

팍스로비드(PAXLOVID)는 COVID-19로 인한 중증 질환의 위험도가 높은 성인의 입원 또는 사망을 예방할 수 있습니다. COVID-19 증상이 시작된 후 5일 이내에 복용해야 합니다.

팍스로비드란 무엇인가요?

팍스로비드는 다음과 같은 사람들에게서 경증에서 중등도까지의 COVID-19를 치료할 수 있는 새로운 약품입니다.

- 12세 이상으로 체중이 최소 88파운드인 사람
- COVID-19 바이러스 테스트에서 양성반응을 보인 사람
- 입원 및 사망을 포함한 *중증 COVID-19 고위험군인 사람*

팍스로비드는 5일 동안 경구로(알약을 삼켜서) 투여하는 약제입니다. 증상이 없어지더라도 치료 일정을 모두 완료해야 합니다.

미국 식약처(FDA)는 COVID-19 팬데믹 기간에 **팍스로비드**가 사용될 수 있도록 긴급사용승인(EUA)을 허가했습니다. 팍스로비드는 미국 내에서 FDA 승인을 받은 약제가 아닙니다.

다음에 해당하는 경우 귀하의 의료서비스 제공자에게 알리십시오.

- 알러지가 있음
- 신장 또는 간 질환이 있음
- 임신 중이거나 임신할 수 있음
- 수유 중임
- 중증 질환이 있음
- 약물을 복용 중임(처방약, 일반 의약품, 비타민, 허브 제품)
- 복합 호르몬 피임약을 복용 중인 경우(팍스로비드가 피임약의 작용에 영향을 미칠 수 있음)

팍스로비드는 부작용이 있나요?

- **팍스로비드**는 복용 중인 다른 약제에 반응할 수 있습니다. 담당 의사에게 현재 복용 중인 약물을 모두 알리는 것이 중요합니다.
- **팍스로비드**는 **간 질환**을 유발할 수 있습니다.
- **팍스로비드**는 인간면역결핍바이러스(HIV) 약물에 대해 **내성**을 발생시킬 수 있습니다.
- 기타 **부작용**에는 다음이 포함될 수 있습니다.
  - 미각의 변화
  - 설사
  - 고혈압
  - 근육통

COVID-19 검사 결과가 양성인 경우, 치료 방법에 대해 **즉시 담당 의료서비스 제공자와 상담하십시오.**
사용할 수 있는 치료제에는 모두 처방전이 필요합니다.

VIRGINIA'S HEALTH IS IN OUR HANDS.
Do your part, stop the spread.

COVID-19 치료제에 관한 자세한 정보는 https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/treatments에서 확인할 수 있습니다.

VDH VIRGINIA DEPARTMENT OF HEALTH

2022년 4월 수정