

د ناروغ معلومات: PAXLOVID

PAXLOVID ښايي هغه کسان له بستر کېدو يا مړينې وژغوري چې د COVID-19 د جدي ناروغيو په لور گواښ کې دي. دا بايد د COVID-19 د نښو له پيلېدو وروسته په 5 ورځو کې واخيستل شي.

PAXLOVID څه شی دی؟

PAXLOVID يو نوی درمل دی چې له منځني څخه تر جدي پورې د هغو کسانو د COVID-19 د درملنې لپاره کارېږي چې:

◀ 12 کلن يا تر دې زيات عمر لرونکي چې وزن يې لږ تر لږه 88 پونده وي

◀ د COVID-19 وېروس د ټېسټ پایله يې مثبتې وي

◀ د بستر کېدو او مړينې په کېدون د جدي COVID-19 په لور گواښ کې دي

PAXLOVID داسې درمل دي چې د 5 ورځو لپاره د خولې له لارې (د کولې، تېرول) کارول کېږي. د درملنې دوره دې ته له پام پرته چې نښې ورکې شوي، بايد بشپړه شي

د متحده ايالاتو د خوړو او درملو ادارې (FDA) د COVID-19 وبا پر مهال د PAXLOVID د چمتو کولو لپاره د بيړني کارونې اجازه (EUA) صادره کړې. PAXLOVID په امريکا متحده ايالاتو کې د FDA تاييد شوي درمل نه دي.



خپل د روغتيايي پاملرنې چمتو کوونکي ته ووايئ که چېرې تاسو:

◀ کوم حساسيتونه لرئ

◀ د بډوډو يا ځيگر ستونزې لري

◀ امېندواره دي يا ښايي امېندواره شي

◀ ماشوم ته شيدې ورکوي

◀ کومه جدي ناروغي لري

◀ يو ډول درمل کاروي (د نسخې، له نسخې پرته، ویتامينونه يا گياهي توليدات)

◀ که د امېندوارې، ضد ترکيبي هورموني درمل کاروئ (PAXLOVID ممکن ستاسو د امېندورې ضد درملو اغېز متاثر کړي)



ایا PAXLOVID جانبي عوارض لري؟

◀ PAXLOVID ښايي له نورو درملو سره چې تاسو يې کاروئ، گډ شي. دا مهمه ده چې خپل ډاکټر ته د

خپلو ټولو اوسنيو درملو په اړه ووايئ.

◀ PAXLOVID ښايي د ځيگر د ستونزوسبب شي.

◀ PAXLOVID ښايي د HIV درملو پر وړاندې د مقاومت سبب شي.

◀ نو احتمالي جانبي عوارض دا کېدی شي:

< د خوند احساس بدلېدل

< اسهال

< د وينې لوړ فشار

< د عضلو درد



PAXLOVID چيرته موندلی شم؟

د PAXLOVID ځايونه د VDHD COVID-19 درملنې لوکيټر په وسيله کې موندل کېدی شي. لېنک د VDHD په ويب پاڼه کې يوه متقابلې نقشه او د لنډيز جدولونه دي چې خلکو او چمتو کونکو ته اجازه ورکوي چې په ویرجینیا کې د درملنې سايټونه ومومي:

<https://www.vdh.virginia.gov/mabs/covid-19-treatment-locator/>



د ټولو شته درملنو لپاره نسخه اړينه ده.

