

앞으로 어떻게 COVID-19 백신의 안정성이 모니터링되나요



임상 시험, 승인 및 대중에게 배포 1, 2 및 3 상) 후, 보건 전문가가 COVID-19 백신의 안정성과 효과를, 다른 백신과 마찬가지로 계속해서 모니터링합니다.

누가 관여하나요?

ACIP (예방 접종 자문 위원회)

- 예방 접종 전문 지식을 갖춘 의료 및 공중 보건 전문가. 미국 소아과학회(AAP) 및 미국 가정의학회(AAFP) 같은 기관의 회원이 포함됩니다.
- 예방 접종 일정을 만들고 모니터링을 돕습니다.

VAERS (백신 이상 반응 보고 시스템)

- 백신 접종 후 이상 반응을 수집 및 보고하는 시스템입니다.
- 부모, 환자, 의료 전문가의 보고서를 포함합니다.

VSD & PRISM (백신 안전 데이터 링크) 및 (사후 승인 신속 예방 접종 안전성 모니터링)

- 과학자들이 미국 내 백신 사용을 모니터링하는 두 가지 시스템.
- 양쪽 모두 건강 관리 정보를 분석합니다.

CISA (임상 면역 안전성 평가 프로젝트)

- CDC와 7 의학 연구 센터 간의 협력.
- 임상 연구를 수행하고 미국 의료 서비스 제공자를 지원하는 백신 전문가를 포함합니다.

프로세스는 무엇인가요?



ACIP는 미국에서 질병을 통제하기 위해 백신을 사용하는 방법에 대한 권장 사항을 개발합니다.



미국 내 모든 백신에 대해 다양한 기관과 조직을 통해 계속해서 안전성 및 효과를 모니터링합니다.



FDA와 CDC는 4상으로 알려진 모니터링 과정의 일부입니다. 이것은 대중이 백신을 접종받기 시작한 후 발생합니다.



이 과정의 일부는 백신을 접종한 사람들의 부작용을 관찰하고 관련된 모든 기타 위험을 식별하는 것입니다.

V-safe는 스마트 폰 톨로 COVID-19 백신을 접종한 후 모든 부작용에 대해 CDC에 알리는 데에도 사용할 수 있습니다.

백신의 제조, 검사 및 배포 방법에 대한 자세한 정보는 vdh.virginia.gov/covid-19-vaccine에 방문하거나 877-ASK-VDH3에 전화하십시오.



VDH VIRGINIA
DEPARTMENT
OF HEALTH