

COVID-19 백신을 접종했다면, 그 다음은



많은 사람들이 백신을 접종하게 될 때까지 우리는 우리 자신과 다른 사람들을 보호하기 위한 조치들을 계속해서 취할 필요가 있습니다. 백신을 접종한 후에도 계속 마스크를 착용하고(실내와 실외에서 다른 사람들이 주변에 있을 경우), 다른 사람들과 6피트 이상 거리를 두고, 사람들이 많은 곳을 피하고, 자주 손을 씻으십시오.

2차 백신 접종 계획 세우기

- 현재 접종 가능한 COVID-19 백신들은 최선의 보호 효과를 위해 **2회** 접종을 해야 합니다.
- 1차 접종을 받았다면, 그 후 **3주 또는 4주 후에** 같은 브랜드의 백신을 2차로 접종할 계획을 세우십시오.
- 접종 시기는 **어떤 백신을** 접종했는지에 따라 다릅니다.
- 첫 번째로 접종을 받은 곳에서 두 번째 접종 시기 **알람**을 보내주는지 알아보십시오. 보내주지 않을 경우, 종이나 전자 달력에 **메모**를 해두십시오.
- 백신 접종 후 경미한 발열, 몸살, 두통 등의 부작용이 나타나는 경우에도, 의료진이 접종을 하지 말아야 한다고 하지 않는 한 **두 번째 접종을 받는 것이 안전합니다.**

백신 부작용 보고하기

- 부작용은 우리의 몸이 COVID-19에 대한 **보호능력을 만들고 있다는** 신호입니다. 부작용은 며칠 후 사라질 것입니다.
- **vsafe.cdc.gov**에서 CDC의 안전한 스마트폰 도구에 무료 등록하면 정보를 얻을 수 있으며 부작용에 대해 CDC에 알릴 수 있습니다.
- 부작용이 사라지지 않거나 부작용에 관해 우려가 있을 경우, **의료 전문가에게 문의하십시오.**



백신의 작용에 대한 자세한 내용은 vdh.virginia.gov/covid-19-vaccine 을 방문하거나 877-ASK-VDH3에 문의하십시오.



VDH VIRGINIA
DEPARTMENT
OF HEALTH