



ماذا عليّ أن أفعل كمقدم رعاية صحية إذا ظهرت لدي أعراض

بعد لقاح كوفيد-19

ردود فعل تحسسية شديدة

نادرًا ما تحدث ردود فعل تحسسية شديدة بعد الحصول على لقاح كوفيد-19. وهي تتطلب عناية طبية فورية. اتصل برقم 9-1-1 إذا كنت تعتقد أنك تعاني من رد فعل تحسسي شديد بعد مغادرة موقع التطعيم. ويمكن أن تشمل ما يلي:

- الشعور بأن حلقك ينغلق
- الصفير أو ضيق في التنفس
- الغثيان، القيء، أو الإسهال
- الدوار أو الإغماء
- تسارع ضربات القلب
- شرى، أو حكة، أو تورم الشفاه، والوجه والحلق



أعراض كوفيد-19

- إذا ظهرت عليك أعراض كوفيد-19، بما في ذلك الحمى، السعال، ضيق التنفس، التهاب الحلق، أو فقدان التذوق أو الشم، ابق في المنزل واتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك.
- باستثناء الحمى، هذه الأعراض ليست آثارًا جانبية متوقعة للقاح.
- ربما كنت قد تعرضت لكوفيد-19 قبل حصولك على اللقاح وقد ظهرت الأعراض الآن. لا يمكنك أن تصاب بكوفيد-19 من اللقاح

الآثار الجانبية الشائعة

قد تظهر آثار جانبية خفيفة خلال الأيام القليلة التالية، وهي تُبين أن جسمك يعمل على بناء الحماية. وهي تشمل:

- احمرار، ألم، أو تورم في الذراع حيث حصلت على الحقنة
- حمى خفيفة، شعيرية، صداع أو شعور بالتعب

يجب أن تختفي هذه بعد بضعة أيام. لإبلاغ CDC عن أي آثار جانبية، يمكنك التسجيل للحصول على أداة الهاتف الذكي المجانية والأمنة على vsafe.cdc.gov. اتصل بمقدم الرعاية الصحية إذا كنت قلقًا بشأن الآثار الجانبية التي تعاني منها.

مع ذلك، بإمكانك العمل إذا ظهرت عليك هذه الآثار الجانبية الخفيفة بعد الحصول على لقاح كوفيد-19، طالما أنك تشعر بصحة جيدة ولا تعاني من الحمى.

مواقع التطعيم جاهزة لمساعدة الأشخاص الذين لديهم ردود فعل تحسسية فورية. بعد التطعيم، ابق في مركز التطعيم لمدة 15 دقيقة على الأقل. إذا كنت تعتقد أنك تعاني من ردود فعل تحسسية شديدة بعد مغادرة موقع التطعيم، اتصل برقم 9-1-1 أو اذهب لأقرب مستشفى.



VDH VIRGINIA
DEPARTMENT
OF HEALTH

لمزيد من المعلومات حول لقاح كوفيد-19، تفضل بزيارة vdh.virginia.gov/covid-19-vaccine، تفضل بزيارة
أو اتصل بالرقم 877-ASK-VDH3.