

作为医护人员，如果我 注射COVID-19疫苗 后出现症状该怎么办



严重的过敏反应

接种COVID-19疫苗后出现严重过敏反应比较少见，需要立即就医。如果您在离开接种地点后出现严重过敏反应，请拨打9-1-1。这些症状包括：

- 感觉喉咙关闭了
- 喘息或气短
- 恶心、呕吐或腹泻
- 头晕或昏厥
- 心跳加快
- 荨麻疹、瘙痒或嘴唇、面部和喉咙肿胀



常见副作用

在接下来的几天里，可能会出现轻微的副作用，表明您的身体正在努力建立保护。这些副作用包括：

- 打针的手臂发红、疼痛或肿胀。
- 轻度发烧、畏寒、头痛或感觉疲倦

这些情况会在几天后消失。要让美国疾控中心了解各种副作用，您可以在vsafe.cdc.gov上注册一个免费、安全的智能手机工具。如果您担心您正在经历的副作用，请致电医生或职业健康服务机构。

如果您在接种COVID-19疫苗后有这些常见的、轻微的副作用，只要您感觉可以，不发烧，仍然可以工作。

COVID-19 症状

- 如果您出现COVID-19症状，包括发烧、咳嗽、呼吸急促、咽喉痛或味觉或嗅觉丧失，请呆在家中并致电您的医生。
- 除了发烧，这些症状都不是疫苗的副作用。
- 您可能在接种疫苗之前接触过COVID-19，现在才出现症状。打疫苗是不会感染COVID-19病毒的。

接种点可以随时帮助有即时过敏反应的人。接种疫苗后，至少要在接种点停留15分钟。如果您在离开接种点后出现严重过敏反应，请拨打9-1-1或到最近的医院就诊。

