



## معلومات مهمة حول لقاح جونسن آند جونسن/جنسن ضد كوفيد-19

في الثالث والعشرين من أبريل 2021، أوصى مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستئناف لقاح جونسن آند جونسن/جنسن المخصص لكوفيد-19 في الولايات المتحدة بعد انقطاع مؤقت.

أصيب بعض الأشخاص الذين تلقوا لقاح جونسن آند جونسن بجلطات دموية شملت الأوعية الدموية في الدماغ والبطن والساقين بالإضافة إلى انخفاض في مستويات الصفائح الدموية وهي خلايا الدم التي تساعد الجسم على وقف النزيف. ولوحظ أنّ الأعراض قد بدأت في الظهور بعد أسبوع أو أسبوعين تقريبًا من التطعيم لدى الأشخاص الذين تعرضوا لهذه الجلطات الدموية وإلى انخفاض في مستويات الصفائح الدموية. وكان أغلب المصابين بهذه الجلطات الدموية والتي تدنت مستويات الصفائح الدموية لديهم من فئة الإناث ممن تتراوح أعمارهن بين 18 و49 عامًا. ولهذا فإن إمكانية حدوث ذلك منخفضة للغاية.

تُظهر مراجعة لجميع البيانات المتاحة في الوقت الحالي أن الفوائد المعلومة والمحتملة للقاح جونسن آند جونسن/جنسن تفوق مخاطره. ورغم ذلك، على النساء اللاتي يبلغن من العمر أقل من 50 عامًا أن يكنّ على دراية بهذا الخطر النادر والمتزايد في نفس الوقت وأن هناك خيارات أخرى متوفرة للقاح ضد كوفيد-19 خالية من هذا الخطر.

- هذا العرض الجانبي نادر الحدوث، حيث يحدث بمعدل حوالي سبعة لكل مليون امرأة ملقحة ممن تتراوح أعمارهن بين 18 و49 سنة.
- بالنسبة للنساء البالغات من العمر 50 سنة فما فوق والرجال من جميع الأعمار، فإن هذا العرض الضار يكون أكثر نُدرة.

## خيارات لقاح بديلة

اعتبارًا من 23 أبريل 2021، لم يتم ربط هذا الحادث الضار باللقاحين الآخرين المتاحين لكوفيد-19 من إنتاج شركتي فايزر-بيونتيك أو موديرنا.

يرجى الاستفسار عن توفر لقاح بديل اليوم في هذه العيادة في حالة عدم تلقي لقاح جونسن آند جونسن. يرجى الملاحظة أن اللقاحات الأخرى تتطلب جرعتين بدلاً من جرعة واحدة وتستدعي زيارة إضافية إلى موقع العيادة هذا للحصول على الجرعة الثانية.

في حالة الرغبة في استعمال لقاح آخر ولم يكن هذا البديل متاحًا في موقع التطعيم هذا، فيمكنك زيارة الموقع التالي: [vaccinate.virginia.gov](http://vaccinate.virginia.gov) أو الاتصال بالرقم التالي: (877-829-4682) 877-VAX-IN-VA لتحديد موعد لتلقي اللقاح المفضل لديك للوقاية من كوفيد-19.