



有关强生公司 COVID-19 疫苗的重要信息

2021年4月23日，美国疾病控制和预防中心（CDC）和美国食品和药物管理局（FDA）建议在暂时停用之后，在美国恢复使用强生公司的 COVID-19 疫苗。

一些人接种过强生公司的 COVID-19 疫苗后出现了波及大脑、腹部和腿部血管的凝血以及血小板（帮助身体止血的血细胞）水平大幅降低。在出现凝血和血小板水平大幅降低的人群中，症状大约在接种疫苗后一到两周开始出现。发生这种凝血和血小板水平降低的大多数人是女性，年龄在18至49岁之间。发生这种情况的几率非常低。

对目前所有可用数据的审查表明，强生疫苗的已知和潜在益处超过其已知和潜在风险。然而，50岁以下的女性应该意识到这种虽然罕见但潜在的风险，并且有其他尚未发现存在这种风险的新冠肺炎疫苗可供选择。

- 这种副作用很罕见，每100万名18至49岁之间接种过该疫苗的妇女中约有7名出现这种副作用。
- 对于50岁以上的女性和各个年龄段的男性，这种不良事件更加罕见。

其他疫苗选择

截至2021年4月23日，接种辉瑞BioNTech 或 Moderna 公司生产的其他两种 COVID-19 疫苗的人群尚未出现该不良事件。

如果您不想接种强生疫苗，请咨询诊所当天是否有替代疫苗。请注意，其他这两种疫苗需要打两针而不是一针，您需要回该诊所接种第二针。

如果您希望使用另外的疫苗并且在该疫苗接种地点无法获得该疫苗，则可以访问 vaccinate.virginia.gov 或致电 877-VAX-IN-VA（877-829-4682）安排预约以接种您选择的 COVID-19 疫苗。

