



JOHNSON & JOHNSON/JANSSEN COVID-19 백신에 대한 중요 정보

2021년 4월 23일, Centers for Disease Control and Prevention (CDC)와 U.S. Food and Drug Administration (FDA)는 Johnson & Johnson의 Janssen (J&J/Janssen) COVID-19 백신의 일시 사용 중단 이후, 미국에서의 해당 백신 사용을 재개할 것을 권고했습니다.

J&J/Janssen 백신을 접종한 사람들 중 일부에게서 뇌, 복부, 다리 혈관에서의 혈전 및 혈소판(몸에서 출혈이 멎도록 도와주는 혈액 세포) 수치 저하가 발생했습니다. 혈전 및 낮은 혈소판 수치가 발생한 사람들에게서는 백신 접종 후 대략 1-2주에 증상이 나타나기 시작했습니다. 혈전 및 낮은 혈소판 수치가 나타난 사람들의 대부분은 18세에서 49세 사이의 여성들입니다. 이런 증상이 나타날 가능성은 매우 낮습니다.

현재 이용 가능한 모든 데이터를 검토한 결과 J&J/Janssen 백신의 알려진 이점 및 잠재적 이점이 잠재적 위험성보다 더 큰 것으로 나타났습니다. 그러나 50세 미만의 여성에게서는 이러한 증상이 드물기는 하나 위험성이 증가한다는 사실에 유의해야 하며, 해당 위험성이 발생하지 않은 다른 COVID-19 백신 선택이 가능합니다.

- 이러한 부작용은 드물며, 백신을 접종한 18세에서 49세 사이의 여성 100만 명 중 약 7명 정도의 비율로 발생합니다.
- 50세 이상의 여성과 모든 연령대의 남성에게서는 이런 부작용이 훨씬 적게 나타납니다.

기타 백신 선택

2021년 4월 23일 현재, 해당 부작용은 접종 가능한 다른 두 종류의 COVID-19 백신인 Pfizer-BioNTech와 Moderna의 백신과는 연관이 없습니다.

Johnson & Johnson 백신을 접종하지 않을 것으로 결정하셨다면, 오늘 이 클리닉에서 다른 백신을 접종하는 것이 가능한지 문의하십시오. 다른 백신들은 1회가 아닌 2회 접종이 필수이며, 두 번째 접종을 위해 본 클리닉에 다시 방문해야 합니다.

만약 다른 백신을 접종하고 싶으나 본 백신 접종처에서 해당 백신의 접종이 불가할 경우, vaccinate.virginia.gov를 방문하거나 877-VAX-IN-VA (877-829-4682)로 전화하여 선호하는 COVID-19 백신을 접종하기 위한 예약을 할 수 있습니다.