

الآثار الجانبية بعد لقاح كوفيد-19

من النادر حدوث تفاعلات حساسية شديدة بعد أخذ لقاح كوفيد-19. قد تظهر بعض الأعراض الخفيفة بعد أخذ لقاح كوفيد-19 إذ يقوم جسمك ببناء الحماية.

حقائق عن كوفيد-19

الآثار الجانبية الشائعة

تشمل الأعراض الخفيفة التي يجب أن تختفي في غضون أيام قليلة بعد لقاح كوفيد-19 ما يلي:

- احمرار، أو ألم، أو تورم في الذراع الذي حُقن فيه اللقاح
- حمى خفيفة، أو قشعريرة، أو صداع، أو الشعور بالتعب

تفاعلات حساسية شديدة

من النادر حدوث تفاعلات حساسية شديدة بعد أخذ لقاح كوفيد-19. اتصل برقم 1-9 أو اطلب رعاية طبية فوراً إذا ظهر عليك أعراض.

أماكن اللقاح جاهزة لمساعدة الأشخاص الذين ظهر عليهم ردود فعل تحسسية فور أخذ اللقاح. ابق في المكان الذي أخذت فيه اللقاح لمدة 15 دقيقة على الأقل بعد أخذه.

ركز لبيجستال كنكيم ناجم مع مائة حوفير ال تو الأمان هولل تف
ي ثار ج نبية. ل ع قومال مذكية (vsafe.cdc.gov)، لاغب لإمرل ع قرطيسال
الأمر اض (CDC) بآ

من الجيد أن تعرف

- لا يمكن أن تصاب بكوفيد-19 بسبب أخذ اللقاح.
- ربما تكون قد تعرضت لفيروس كوفيد-19 قبل أن تتلقى جرعة اللقاح، لذا؛ تبدأ في الشعور بأعراضه.
- اتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت تعاني من السعال أو ضيق التنفس أو التهاب الحلق أو فقدان حاسة التذوق أو الشم أو أي آثار جانبية تسبب لك القلق ولا يبدو أنها ستختفي بعد بضعة أيام.

سجل للحصول على لقاح كوفيد-19 مجاناً!