

# Efè segondè aprè yon vaksen COVID-19

Reyaksyon alèjik grav aprè ou fin pran yon vaksen COVID-19 se yon bagay ki ra. **Aprè yon vaksen COVID-19, ou kapab gen kèk sentom lejè pandan kò ou ap konstui pwoteksyon.**



## PALE DIRÈK SOU COVID-19

### Efè segondè ki komen yo

Sentom lejè yo ki kapab ale nan **kèk jou** aprè vaksen COVID-19 ou an enkli:

- Woujè, doulè oubyen nan bra kote ou te pran piki a vin anfle
- Fyè lejè, frison, tèt fè mal, oubyen santi w fatige

### Reyaksyon alèjik grav

Reyaksyon alèjik grav yo aprè ou fin pran yon vaksen COVID-19 se yon bagay ki ra. **Rele 9-1-1 oubyen chache swen medikal imedya si ou genyen divès sentom.**

**Sit Vaksinasyon** yo prè pou ede moun ki gen reyaksyon alèjik imedya yo. Rete nan sit vaksinasyon pou omwen 15 minit aprè vaksen an.

Pou fè CDC konnen sou nenpòt efè segondè, ou kapab enskri pou yon **zouti telefòn entèlijan gratis, sekirize nan V-san danje apre Checker sante vaksen** ([vsafe.cdc.gov](https://vsafe.cdc.gov)).

### Sa pou w konnen

- Ou **pa kapab** pran COVID-19 apati de vaksen an.
- Ou **kapab ekspoze** ak COVID-19 avan ou pran yon dòz epi w ap jis santi kounye a sentom viris yo.
- **Rele founisè swen sante ou an** si ou genyen tous, souf kout, gòj fè mal, pèdi sans gou ou ak odè ou, oubyen efè segondè ou yo ap enkyete ou epi ou sanble pa kapab soti aprè kèk jou.

**Pran vaksen ou GRATIS!**