

ከ COVID-19 ክትባት በኋላ የጎንዮሽ ጉዳቶች

የ COVID-19 ክትባት ከወሰዱ በኋላ ከባድ የአለርጂክ አጻፋዊ ምላሾች የሚኖረው በጣም አልፎ አልፎ ነው። ከ COVID-19 ክትባት በኋላ፣ ሰውነትዎ መከላከያ እስኪገነባ ድረስ ቀላል ምልክቶች ሊኖርዎቹ ይችላሉ።



ስለ COVID-19 ትክክለኛ ወሬ

የተለመዱ የጎንዮሽ ጉዳቶች

ከ COVID-19 ክትባት ከጥቂት ቀናት በኋላ የሚጠፉ አነስተኛ ምልክቶች የሚከተሉትን ያካትታሉ፡

- ክትባቱን የወሰዱበት ክንድ ላይ መቅላት፣ ህመም ወይም ማበጥ
- አነስተኛ ትኩሳት፣ ብርድ ብርድ ማለት፣ የራስ ህመም፣ ወይም ድካም መስማት

ከባድ የአለርጂክ አጻፋዊ ምላሾች

የ COVID-19 ክትባት ከወሰዱ በኋላ ከባድ የአለርጂክ አጻፋዊ ምላሾች የሚኖረው በጣም አልፎ አልፎ ነው። ምልክቶች ካለብዎ ወደ 9-1-1 ይደውሉ ወይም አፋጣኝ የህክምና እንክብካቤ ያግኙ።

የክትባት ጣቢያዎች ወዲያውኑ የአለርጂክ አጻፋዊ ምላሾች ያለባቸውን ሰዎች ለመርዳት ዝግጁ ናቸው። ከክትባቱ በኋላ በክትባቱ ጣቢያ ቢያንስ ለ15 ደቂቃዎች ይቆዩ።

ማወቅ ጥሩ ነው

- በክትባቱ ምክንያት COVID-19 አይዘትም።
- ክትባትዎን ከመውሰድዎ በፊት ለ COVID-19 ተጋላጭ ሆነው ሊሆን ይችላል እና አሁን የሚሰማዎት ስሜት የቫይረሱ ምልክቶች ናቸው።
- ሳል፣ የትንፋሽ ማጠር፣ የጉሮሮ ህመም፣ የጣዕም ወይም የሽታ ስሜት ማጣት፣ ወይም የጎንዮሽ ጉዳቶች እያስጨነቁት ከሆነ እና ከጥቂት ቀናት በኋላም እየጠፉ ካልሆነ የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ ጋር ይደውሉ።

ነጻ ክትባትዎን ያግኙ!

ስለማንኛውም የጎንዮሽ ጉዳቶች ለ CDC ለማሳወቅ፣ ነጻ፣ ደህንነቱ አስተማማኝ ለሆነው የስማርትፎን መሳሪያ በ V-Safe After Vaccine Health Checker (vsafe.cdc.gov) መመዘገብ ይችላሉ።