

LƯU VỰC RAPPAHANNOCK RIVER



VÙNG NƯỚC VÀ RANH GIỚI BỊ ẢNH HƯỞNG	CÁC ĐỊA PHƯƠNG BỊ ẢNH HƯỞNG	CHẤT GÂY Ô NHIỄM	LOÀI	KHUYẾN CÁO/HẠN CHẾ
Rappahannock River (từ cầu I-95 phía trên hạ lưu Fredericksburg tới cửa sông gần Stingray Point, bao gồm các phụ lưu Hazel Run đến cầu vượt I-95 và Claiborne Run đến cầu vượt Rt. 1. Tổng các khúc sông này dài ~ 123 dặm).	Stafford Co., Spotsylvania Co., Fredericksburg City, Caroline Co., King George Co., Essex Co., Westmoreland Co., Richmond Co., Middlesex Co., Lancaster Co.	PCB	Cá chình Mỹ (American Eel) 	Không quá hai bữa/tháng
		PCB	Cá trê xanh (Blue Catfish) 	
		PCB	Cá chép 	
		PCB	Cá nheo Mỹ (Channel Catfish) 	
		PCB	Cá đù (Croaker) 	
		PCB	Cá mòi (Gizzard Shad) 	
		PCB	Cá vược sọc Anadromous (ven biển) 	
Mountain Run (từ cầu vượt Rt. 15/29 gần Culpeper City ~ 19 dặm về phía hợp lưu với Rappahannock River)	Culpeper Co.	PCB	Cá chình Mỹ (American Eel) 	Không quá hai bữa/tháng
Motts Run Reservoir (toàn bộ hồ chứa, ~ 160 mẫu Anh)	Spotsylvania Co.	Thủy ngân	Cá vược miệng rộng (Largemouth Bass) 	Không quá hai bữa/tháng
Chandler's Mill Pond (toàn bộ ao, ~ 75 mẫu Anh)	Westmoreland Co.	Thủy ngân	Cá vược miệng rộng (Largemouth Bass) 	Không quá hai bữa/tháng

*Một bữa ăn được tính là một khẩu phần cá nặng 8 ounce (nửa pound).

Khuyến cáo về việc tiêu thụ cá được xem xét hàng năm và cập nhật khi cần thiết. Khuyến cáo về việc tiêu thụ cá này đưa ra lời khuyên khi ăn một số loài cá được đánh bắt từ các vùng nước cụ thể. Quý vị nên làm theo hướng dẫn nêu trong khuyến cáo này để giảm tổng nguy cơ tiếp xúc với chất gây ô nhiễm từ cá. Nếu có thắc mắc về nguy cơ đối với sức khỏe con người do tiếp xúc với chất gây ô nhiễm từ cá, hãy liên hệ với [Ban Dịch tễ học Môi trường thuộc Sở Y tế Virginia](#). Để biết thêm thông tin về các vùng nước được lấy mẫu hoặc quy trình lấy mẫu mô cá, hãy liên hệ với [Sở Chất lượng Môi trường Virginia](#).