

حوض نهر جيمس

المسطح المائي والحدود المتأثرة	الاماكن المتأثرة	الملوثات	الفصائل	الإرشادات/القيود
نهر ماوري (من سد بوينا فيستا في الطريق 60 قراية 15 ميلاً إلى نقطة الالتقاء بنهر جيمس)	مقاطعة روكبريدج، مدينة بوينا فيستا	مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	سمكة الشمس ذات الصدر الأحمر	لا أكثر من وجبتين/الشهر
		مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	قاروص صخري	
		مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	سمك السلور (القراميط) البلهد الأصفر	
		مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	سمك الشبوط	
نهر جيمس (من سد بيغ أيلاند (أسفل بلو ريدج باركواي) باتجاه المصب إلى جسر نهر جيمس على الطريق ١٠95 في ريتشموند، بما في ذلك روافده نهر هارودير حتى جسر الطريق 6 ونهر سليت حتى جسر الطريق 676. تمتد هذه القطاعات من النهر لمسافة 234 ميلاً تقريبًا).	مقاطعة أمهيرست، مقاطعة بدفورد، مدينة لينشبيرج مقاطعة كامبل، مقاطعة أبوماتوكس مقاطعة نلسون، مقاطعة بانكجهام مقاطعة أليمارل مقاطعة فلوفانا، مقاطعة كمبرلاند مقاطعة جوتسلاند، مقاطعة هنريكو، مقاطعة تشيسترفيلد مدينة ريتشموند	مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	سمك الشاد المنقط	لا أكثر من وجبتين/الشهر
		مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	سمك الشبوط	
		مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	الأنقليش الأمريكي	
		مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	السلور المسطح الرأس	
		مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	السמكة الماصة ذات الزعفة الشوكية	
		مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	سمك الشاد المنقط	
ممنوع الأكل		مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	سمك الشبوط	ممنوع الأكل
		مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	السلور الأزرق ك 32 بوصة	ممنوع الأكل
		مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	السلور المسطح الرأس ك 32 بوصة	ممنوع الأكل
		مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	السلور الأزرق > 32 بوصة	ممنوع الأكل
نهر جيمس (من جسر نهر جيمس ١٠95 في ريتشموند باتجاه المصب إلى نفق جسر هامبتون روندز و جزء المد والجزر من الروافد التالية: نهر أبوماتوكس حتى سد بحيرة تشيسدين، وخور ببلي حتى الطريق رقم 630، وبوينريس رن، وخليج ببلي، ونهر تشيكاوهميني حتى سد ووكرز، وخور سكيفس حتى سد سكيفس كريك، ونهر باغان وروافده جونز كريك، وتشاكاتوك كريك، ونهر نانسيوموند وروافده بينيت كريك وستار كريك، ونهر هامبتون، وخليج ويلوبي، وشبكة نهر إليزابيث (الفرع الغربي، والفرع الشرقي، والفرع الجنوبي، ونهر لافايت) وروافده المندبة. تمتد هذه القطاعات من النهر لمسافة 325 ميلاً تقريبًا).	مدينة ريتشموند، مقاطعة هنريكو، مقاطعة تشيسترفيلد، مقاطعة مدينة تشارلز، مدينة هوبويل، مدينة كولونيال هايتس، مدينة بطلسبرغ، مقاطعة دينويدي، مقاطعة برينس جورج مقاطعة ساري، مدينة جيمس سيتي مقاطعة نيو كنت، مقاطعة أيل أوف وايت مدينة نيوپورت نيوز سيتي، مدينة سافولك، مدينة پورتسموث، مدينة هامبتون، مدينة نورفولك، مدينة تشيسمايك، مدينة فيرجينيا بيتش	مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	السلور الأزرق > 32 بوصة	لا أكثر من وجبتين/الشهر
		مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	السلور المسطح الرأس > 32 بوصة	
		مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	سمك سلور القاء	
		مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	السلور (القراميط) الأبيض	
		مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	القاروص الكبير الغم	
		مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	سمكة الشمس الزرقاء الخيشيم	
		مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	الأنقليش الأمريكي	
		مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	سمكة شوب الماء	
		مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	سمك السلور (القراميط) البلهد الأصفر	
		مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	سمك الفرخ الأبيض	
		مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	القاروص المنقط	
		مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	سمك القنبر	
		مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	شماهي	
		مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	التعاب الأرقط	
		مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	الرنجة الزرقاء الظهر	
		مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	شاد هيكوري	
		كبيون	جميع الفصائل	
		مدينة پورتسموث، مدينة تشيسمايك، مدينة نورفولك	سرطان البحر الأزرق (الغدة الكبدية البنكرياسية فقط)	
			سمكة شوب الماء	
			سمك السلور (القراميط) البلهد الأصفر	
الفرع الجنوبي لنهر إليزابيث وروافده المندبة (23 ميلاً تقريبًا)		مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة، الديوكسينات	سمك السلور (القراميط) البلهد الأصفر	يحظر أكل الغدة الكبدية البنكرياسية للسرطان أشد تقييدًا. اتبع إرشادات التحذير من ثنائي الفينيل متعدد الكلورة للفسائل المدرجة. أي أسماك من الفصائل غير المدرجة في القائمة، أقصر استهلاكها على وجبة واحدة في اليوم.
			سمك السلور (القراميط) البلهد الأصفر	
			سمك الفرخ الأبيض	
			القاروص المنقط	
بحيرة هاريسون (البحيرة بأكملها، 82 ذانًا تقريبًا)	مقاطعة تشارلز سيتي	الزئبق	سمكة الشمس ذات الأذن الحمراء	لا أكثر من وجبتين/الشهر
		الزئبق	القاروص الكبير الغم	
		الزئبق	سمك الكراكي	
		الزئبق	السמكة الطينية	
بحيرة تشيكاوهميني (البحيرة بأكملها، 1230 ذانًا تقريبًا)	مقاطعة تشارلز سيتي، مقاطعة نيو كنت.	الزئبق	القاروص الكبير الغم	لا أكثر من وجبتين/الشهر
		الزئبق	سمك الكراكي	
		الزئبق	السمكة الطينية	
			القاروص الكبير الغم	
نهر تشيكاوهميني (بما يشمل بحيرة تشيكاوهميني، من نقطة التقاء نهر تشيكاوهميني مع نهر جيمس، عند المنبع إلى جسر طريق الولاية رقم 360 عند الخط الفاصل بين مقاطعتي هنريكو وهانوفر بالقرب من ميكانيكسفيل).	مقاطعة هنريكو، مقاطعة هانوفر، مقاطعة نيو كنت، مقاطعة جيمس سيتي، مقاطعة تشارلز سيتي	السلفونات المشبع بالفلور أوكتين	القاروص الكبير الغم	لا أكثر من وجبتين/الشهر
		السلفونات المشبع بالفلور أوكتين	سمك الكراكي	
		السلفونات المشبع بالفلور أوكتين	جميع أنواع سمك الشمس	
		السلفونات المشبع بالفلور أوكتين	سمك الكرابي الأسود	
خور ميل (الخور بأكمله) بالقرب من فورت مونرو	مدينة هامبتون	مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	سمك الشاد المنقط	لا أكثر من وجبتين/الشهر
		مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	سمك الشبوط	
نهر أبر جيمس (من أول نهر جيمس بالقرب من أيرون جيت (عند التقاء نهر جاكسون ونهر كلاياستور) إلى سد شلالات الكروني في اتجاه مجرى النهر في جلاسكو (بالقرب من نهر موري)	مقاطعة بوتيتاور، مقاطعة روكبريدج.	مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	سمكة شوب الخور الماصة	ممنوع الأكل
		مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	سمك الكراكي	
		مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	جميع أنواع سمك الشمس	

* قد الوجبة حصه من السمك تزن ثمانى أونصات (نصف رطل).

تتم مراجعة إرشادات استهلاك الأسماك سنويًا وتحديثها حسب الحاجة. تقدم إرشادات استهلاك الأسماك هذه توصيات بشأن تناول فصائل معينة من الأسماك التي يتم صيدها من مسطحات مائية محددة. يُوصى بتابع الإرشادات الواردة في هذا الدليل الإرشادي للحد من إجمالي التعرض لموادناات الأسماك. للاستفسار عن المخاطر على صحة الإنسان من التعرض لموادناات الأسماك، اتصل ببرنامج علم السموم التابع لوزارة الصحة في فرجينيا على الرقم 864-8182 (804). للحصول على مزيد من المعلومات بشأن المسطحات المائية التي تم أخذ عينات منها أو على أدلة عينات أنسجة الأسماك، يُرجى الاتصال بإدارة جودة البيئة في فرجينيا.