

حوض نهر شيناندواه

المسطح المائي والحدود المتأثرة	الأماكن المتأثرة	الملوثات	الفصائل	الإرشادات/القيود
نهر ساوث فورك شيناندواه (في اتجاه مجرى النهر من معبر جسر الطريق 619 بالقرب من فرونت رويال إلى نقطة الالتقاء مع نهر نورث فورك شيناندواه، ونهر نورث فورك شيناندواه من مصب النهر وفي اتجاه جريانه حتى سد ريفرتون، ونهر شيناندواه من نقطة الالتقاء مع فرعي نورث فورك وساوث فورك حتى الخط الفاصل بين ولايتي فرجينيا وفرجينيا الغربية. تمتد هذه القطاعات من النهر لمسافة 41 ميلاً تقريبًا).	مقاطعة وارن، مقاطعة كلارك	مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	سمك الشبوط	ممنوع الأكل
		مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	سمك سلور القناة	ممنوع الأكل
		مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	سمكة النهر البيضاء الماصة	ممنوع الأكل
		مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	قاروص صخري	لا أكثر من وجبتين/الشهر
		مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	سمكة شمس المحيط	
مقاطعة أوجوستا، مدينة ستونتون		مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	القاروص الصغير الفم	
		مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	القاروص الكبير الفم	
خور لويس (قرب الطريق 252، جنوب ستونتون في اتجاه مجرى النهر لمسافة 12 ميلاً تقريبًا حتى نقطة الالتقاء مع نهر ميدل بالقرب من لوريل هيل).	مقاطعة أوجوستا، مدينة ستونتون	مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	سمكة النهر البيضاء الماصة	لا أكثر من وجبتين/الشهر
		مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	سمك الشبوط ذو الرأس الأزرق	
النهر الجنوبي (من جسر المشاة في شركة E. I. Dupont Co. في واينسبورو على بعد قرابة 24 ميلاً إلى نقطة التقاء النهر الشمالي في ميناء الجمهورية).	مدينة واينسبورو، مقاطعة أوجوستا، مقاطعة روكينجهام	الزئبق	جميع الفصائل باستثناء سمك السلمون المرقط	ممنوع الأكل تم اختبار أسماك السلمون المرقط في المزارع وهي آمنة للاستهلاك.
نهر ساوث فورك شيناندواه (في اتجاه مجرى النهر من بورت ريبابليك إلى نقطة الالتقاء مع نهر نورث فورك شيناندواه، ونهر نورث فورك شيناندواه من مصب النهر وفي اتجاه جريانه إلى سد ريفرتون، ونهر شيناندواه من نقطة الالتقاء مع فرعي نورث فورك وساوث فورك إلى سد وارن لتوليد الطاقة شمال فرونت رويال مباشرةً. تمتد هذه القطاعات من النهر لمسافة 105 أميال تقريبًا).	مقاطعة وارن، مقاطعة بيج، مقاطعة روكينجهام، مقاطعة أوجوستا	الزئبق	جميع الفصائل	لا أكثر من وجبتين/الشهر يكون التحذير من ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة أكثر تقييدًا لأسماك الشبوط، وسمك سلور القناة، وسمكة النهر البيضاء الماصة.

* تعد الوجبة حصة من السمك تزن ثماني أوقيات (نصف رطل).

تتم مراجعة إرشادات استهلاك الأسماك سنويًا وتحديثها حسب الحاجة. تقدم إرشادات استهلاك الأسماك هذه توصيات بشأن تناول فصائل معينة من الأسماك التي يتم صيدها من مسطحات مائية محددة. يُوصى باتباع الإرشادات الواردة في هذا الدليل الإرشادي للحد من إجمالي التعرض لملوثات الأسماك. للاستفسار عن المخاطر على صحة الإنسان من التعرض لملوثات الأسماك، اتصل [ببرنامج علم السموم التابع لوزارة الصحة في فرجينيا](#) على الرقم 864-8182 (804). للحصول على مزيد من المعلومات بشأن المسطحات المائية التي تم أخذ عينات منها أو عملية أخذ عينات أنسجة الأسماك، يُرجى الاتصال [بإدارة جودة البيئة في فرجينيا](#).