

詹姆斯河流域

水域及受影响边界	受影响地区	污染物	种类	建议/限制
莫里河 从 60 号公路处的布埃纳维斯塔起，约 15 英里至詹姆斯河交汇处）	罗克布里奇郡、布埃纳维斯塔市	多氯联苯	红胸太阳鱼 	每月不超过两餐
		多氯联苯	岩石鲈鱼 	
		多氯联苯	黄颡鱼 	
		多氯联苯	鲤鱼 	
詹姆斯河 （从大岛水坝（蓝岭公园大道下方）向下游到里士满的 I-95 詹姆斯河大桥，包括其支流哈德韦尔河直至6号公路桥，以及板岩河直至676号公路桥。这些河段总长约234英里）。	阿默斯特县、贝德福德县、林奇堡市、坎贝尔县、阿波马托克斯县、纳尔逊县、白金汉县、阿尔伯马尔县、弗卢瓦纳县、坎伯兰县、古奇兰县、波瓦坦县、亨利科县、切斯特菲尔德县、里士满市	多氯联苯	美洲真鲷 	每月不超过两餐
		多氯联苯	鲤鱼 	
		多氯联苯	美洲鳗 	
		多氯联苯	平头鲉鱼 	
		多氯联苯	鲤形亚口鱼 	
詹姆斯河 （从里士满的 I-95 詹姆斯河大桥向下游至汉普顿锚地隧道，以及以下支流的潮汐部分：阿波马托克斯河 直至切斯丁湖大坝，贝利溪直至630号公路，波伊思雷斯溪、贝利湾、奇卡霍米尼河直至沃克斯大坝，斯基夫溪直至斯基夫溪大坝，佩根河及其支流琼斯溪，查卡塔克溪，南塞蒙德河及其支流贝内特溪和斯塔溪，汉普顿河，威洛比湾，以及伊丽莎白河水系（西支、东支、南支和拉斐特河）及潮汐支流。这些河段总长约 325 英里）。	里士满市、亨利科郡、切斯特菲尔德郡、查尔斯市郡、霍普韦尔市、殖民高地市、彼得斯堡市、丁威迪县、乔治亲王县、萨里县、詹姆斯市县、新肯特县 怀特岛郡、纽波特纽斯市、萨福克市、朴次茅斯市、汉普顿市、诺福克市、切萨皮克市、弗吉尼亚海滩市	多氯联苯	美洲真鲷 	请勿食用
		多氯联苯	鲤鱼 	请勿食用
		多氯联苯	蓝鲉鱼 ≥ 32 英寸 	请勿食用
		多氯联苯	平头鲉鱼 ≥ 32 英寸 	请勿食用
		多氯联苯	蓝鲉鱼 < 32 英寸 	每月不超过两餐
		多氯联苯	平头鲉鱼 < 32 英寸 	
		多氯联苯	斑点叉尾鲷 	
		多氯联苯	白鲉鱼 	
		多氯联苯	大口黑鲈 	
		多氯联苯	蓝鳃太阳鱼 	
		多氯联苯	美洲鳗 	
		多氯联苯	鲤形亚口鱼 	
		多氯联苯	小口黑鲈 	
		多氯联苯	明那须雅罗鱼 	
		多氯联苯	黄颡鱼 	
		多氯联苯	白鲈 	
		多氯联苯	桃花鲈鱼 	
		多氯联苯	青鱼 	
		多氯联苯	黄花鱼 	
		多氯联苯	红胸鲈鱼 	
		多氯联苯	蓝背鲱鱼 	
		多氯联苯	北美西鲱 	
		十氯酮	所有种类	多氯联苯建议更严格。所列种类的多氯联苯建议应予以遵循。未列出种类的所有鱼类，每天限制食用一餐。
伊丽莎白河南支及其潮汐支流 （约 23 英里）	朴次茅斯市、切萨皮克市、诺福克市	多氯联苯，二恶英	蓝蟹（仅肝胰腺） 	请勿食用蟹的肝胰腺 （“芥末黄”、绿腺、虾肝）。此建议仅适用于不吃螃蟹的肝胰腺或“芥末黄”（下图）。蟹肉不受此建议约束。 
哈里森湖 （全湖，约 82 英亩）	查尔斯城郡	汞	小冠太阳鱼 	每月不超过两餐
		汞	大口黑鲈 	
		汞	美洲黑狗鱼 	
		汞	弓鲱鱼 	
奇卡霍米尼湖 （全湖，约 1230 英亩）	查尔斯城郡、新肯特郡	汞	大口黑鲈 	每月不超过两餐
		汞	美洲黑狗鱼 	
		汞	弓鲱鱼 	
奇卡霍米尼河 （含奇卡霍米尼湖，从奇卡霍米尼河与詹姆斯河交汇处起，向上游延伸至梅卡尼克斯维尔附近亨里科—汉诺弗县界处的州道 360 号公路桥。）	亨利科郡、汉诺威郡、新肯特郡、詹姆斯城郡、查尔斯城郡	全氟辛烷磺酸	大口黑鲈 	每月不超过两餐
		全氟辛烷磺酸	美洲黑狗鱼 	
		全氟辛烷磺酸	所有翻车鱼种类 	
		全氟辛烷磺酸	黑刺盖太阳鱼 	
米尔溪 （整条溪流），靠近门罗堡	汉普顿市	多氯联苯	美洲真鲷 	每月不超过两餐
詹姆斯河上游段 （从詹姆斯河源头附近“铁门”一带，即杰克逊河与牛牧河交汇处起，至格拉斯哥下游、莫里河附近的阳台瀑布大坝止）	博特托尔特郡、罗克布里奇郡		鲤鱼 	每月不超过两餐
		多氯联苯		
白橡沼泽区 （白橡沼泽及其所有支流：从白橡沼泽与奇卡霍米尼河交汇处起，向上游延伸至白橡沼泽及白橡沼泽溪的源头一带，靠近里士满国际机场）	亨利科郡、查尔斯城郡	全氟辛烷磺酸	溪美洲吸口鱼 	请勿食用
			美洲黑狗鱼 	
			所有翻车鱼种类 	

*一餐是指一份八盎司（半磅）的鱼。

每年对鱼类消费警告进行审查，并根据需要进行更新。本鱼类消费警告包含食用来自特定水体部分鱼类的膳食建议。建议您遵循本警告所示指导，减少与鱼类污染物的接触。欲知接触鱼类污染物对人类的健康风险，请致电（804）864-8182 联系弗吉尼亚州卫生部署理项目。欲知采样水体或鱼类组织采样过程更多信息，请联系弗吉尼亚州环境质量部。