

拉帕汉诺克河流域

水域及受影响边界	受影响地区	污染物	种类	建议/限制
拉帕汉诺克河 （从弗雷德里克斯堡上游的 I-95 大桥向下游至斯汀格雷角附近的河口， 包括其支流黑泽尔溪直至 I-95 大桥交叉口， 以及克莱伯恩溪直至1号公路桥交叉口。这些河段总长约 123 英里）。	斯塔福德县、斯波特西尔瓦尼亚县、 弗雷德里克斯堡市、卡罗琳县、乔治王县、埃塞克斯县、威斯特摩兰县、里士满县、米德尔塞克斯县、兰开斯特县	多氯联苯	美洲鳗 	每月不超过两餐
		多氯联苯	蓝鲶鱼 	
		多氯联苯	鲤鱼 	
		多氯联苯	斑点叉尾鲶 	
		多氯联苯	黄花鱼 	
		多氯联苯	美洲真鲷 	
		多氯联苯	溯河性（沿海）条纹鲈 	
芒廷溪 （从卡尔佩珀市附近的 15 号 / 29 号公路桥交叉口， 约 19 英里至 与拉帕汉诺克河交汇处）	卡尔佩珀县	多氯联苯	美洲鳗 	每月不超过两餐
莫茨溪水库 （整个水库，约 160 英亩）	斯波特西尔瓦尼亚县	汞	大口黑鲈 	每月不超过两餐
钱德勒磨坊池塘 （整个池塘，约 75 英亩）	威斯特摩兰县	汞	大口黑鲈 	每月不超过两餐

*一餐是指一份八盎司（半磅）的鱼。

每年对鱼类消费警告进行审查，并根据需要进行更新。本鱼类消费警告包含食用来自特定水体部分鱼类的膳食建议。建议您遵循本警告所示指导，减少与鱼类污染物的接触。欲知接触鱼类污染物对人类的健康风险，请致电（804）864-8182 联系[弗吉尼亚州卫生部毒理学项目](#)。欲知采样水体或鱼类组织采样过程更多信息，请联系[弗吉尼亚州环境质量部](#)。