


# 关于麻疹的 5 个事实

## 事实 1：麻疹是一种由病毒引起的高传染性疾病



麻疹患者咳嗽或打喷嚏时，麻疹病毒会通过空气传播。麻疹患者离开所处空间后，该病毒可在空气中存活长达 2 小时。



如果没有免疫能力，每 10 名接触麻疹患者的人中约有 9 人会被感染。


## 事实 2：麻疹病情可能很严重



麻疹具有危险性，对婴幼儿尤其如此。




大约每 5 名麻疹患者中，就有 1 人需要住院治疗。



麻疹可能导致肺炎（一种严重的肺部感染）、脑损伤、耳聋和死亡。




脑炎。大约每 1,000 名麻疹患儿中，会有 1 名患上脑炎（脑肿胀）。这可能导致患儿失聪或出现智力障碍。



死亡。每 1,000 名感染麻疹的儿童中，约有 1 到 3 名会因呼吸系统和神经系统并发症而死亡。

## 事实 3：麻疹的症状



高烧



咳嗽



流鼻涕



眼睛发红和/或流泪




皮疹

## 事实 4：最好的保护方式是接种疫苗



- 预防麻疹的最有效方式是接种 MMR（麻疹-腮腺炎-风疹）疫苗。
- 接种两剂 MMR 疫苗，预防麻疹感染的有效率可达 97%。



建议儿童接种 2 剂 MMR 疫苗：

- 第一剂：12 至 15 月龄接种
- 第二剂：4 至 6 岁接种（入学前）

## 事实 5：MMR 疫苗可提供终身保护



接种 MMR 疫苗的人群中，大多数可获得终身保护。  
接种疫苗有助于防止疫情传播，保护社区群体健康。

若要查询您孩子的 MMR 疫苗接种状态，请访问 <https://www.vdh.virginia.gov/immunization/request-immunization-record/>  
若您需要帮助孩子寻找疫苗接种点，请访问：<https://www.vdh.virginia.gov/immunization/provider-locator/>  
若要深入了解麻疹，请访问：[vdh.virginia.gov/measles](https://www.vdh.virginia.gov/measles)