

원숭이 두창 백신: 알아야 할 것

백신 접종: 원숭이 두창에 노출되었거나 위험성이 있다고 생각하는 경우 백신 접종 가능

- 백신을 접종하기 위해 개인 위험 정보를 공유할 의무가 없습니다.
- Medicaid 및 Medicare가 백신 비용을 지불합니다.
- 대부분의 개인 보험이 백신 비용을 지불합니다. 의료 보험 제공자에게 문의하여 확인하세요.
- 백신 보장을 받지 못한다면 지역 보건부에 저비용 또는 무료 원숭이 두창 백신에 대해 문의하세요. vdh.virginia.gov/health-department-locator에서 근처 보건부를 찾아보세요.

2차 접종: 2차 접종을 통한 최대 예방 효과

- 1차 접종 28일 후에 2차 접종을 맞으면 가장 좋습니다.
- 1차 접종 이후 오랜 시간이 지났더라도 지금 2차 접종을 맞을 수 있습니다.
- 2차 접종 후 2주 뒤에 원숭이 두창에 대한 최대 예방 효과가 발생합니다.

최적의 장소: 백신 접종 위치 선택

팔, 등 위쪽, 어깨에 접종이 가능합니다.

자세한 정보는

vdh.virginia.gov/mpox에서
확인

