

¿CÓMO HACER LA PRUEBA DE DETECCIÓN DE FENTANILo?



IMPORTANTE:

Las tiras reactivas pueden indicar si las drogas que consumes contienen fentanilo. Puede haber otras drogas o sustancias que no detecte la tira reactiva.

CÓMO UTILIZAR EN DROGAS INYECTABLES:

Qué necesitas:

- Tira reactiva de fentanilo
- Cucharadita de agua (5 mL)*
- Jeringuilla vacía
- Recipiente



* Si realizas la prueba de fentanilo en metanfetamina, usa ½ taza de agua.

Al inyectarte drogas, lo mejor es hacer siempre una inyección de prueba e ir despacio al inyectarte.

1. Prepara la dosis y colócala en una jeringuilla. No te inyeces todavía. Deja la jeringuilla preparada a un lado y agrega 5 mL de agua al recipiente.
2. Revuelve la mezcla.
3. Sujeta la tira reactiva por el extremo azul e insértala en la solución, pero no pases la línea azul. Déjala ahí durante unos 15 segundos.
4. Coloca la tira reactiva plana sobre el recipiente, durante un minuto completo.
5. Comprueba los resultados de la tira reactiva.
6. Tira el recipiente y el líquido restante. El líquido restante ahora es tóxico.

QUÉ SIGNIFICAN LOS RESULTADOS:



→ **Positivo** - la droga contiene fentanilo.



→ **Negativo** - la prueba no detectó fentanilo en la muestra de droga

CÓMO UTILIZAR EN DROGAS QUE SE ESNIFAN O SE TOMAN POR VÍA ORAL:

Qué necesitas:

- Tira reactiva de fentanilo
- Cucharadita de agua (5 mL)*
- Pastilla o píldora
- Utensilio utilizado para triturar pastillas o píldoras (como el dorso de una cuchara)

* Si realizas la prueba de fentanilo en metanfetamina, usa ½ taza de agua.

Si la droga que utilizas viene en comprimidos, tritura los mismos y mezcla bien. Si por el contrario son cápsulas, abre las cápsulas y mezcla bien. El fentanilo se apelmaza o amontona y mezclarlo bien garantiza los mejores resultados de detección.

1. Agrega 5 mL (una cucharadita) de agua a una pequeña cantidad de tu suministro.
2. Sujeta la tira reactiva por el extremo azul e insértala en la solución, pero no pases la línea azul. Déjala ahí por unos 15 segundos.
3. Coloca la tira reactiva sobre una superficie limpia durante un minuto completo.
4. Verifica los resultados de la tira reactiva.
5. Tira la solución porque el líquido restante ahora es tóxico.



→ La prueba **no es válida**



→ La prueba **no es válida**

**ENLACE AL SITIO WEB DEL FABRICANTE**

<https://www.btnx.com/HarmReduction>

Encuentra más información sobre cómo realizar pruebas de detección de fentanilo utilizando estas tiras reactivas.

**ENLACE AL SITIO WEB SOBRE REDUCCIÓN INTEGRAL DE DAÑOS DE VDH**

<https://www.vdh.virginia.gov/disease-prevention/chr/>

Una estrategia de VDH para reducir el impacto negativo del consumo de drogas, incluido el VIH, la hepatitis C, otras infecciones, sobredosis y muerte entre las personas que no pueden o no están preparadas para dejar de consumir drogas.

AVISO LEGAL:

Cualquier persona que haya recibido tiras reactivas de fentanilo acepta toda responsabilidad por cualquier daño, lesión o muerte causado por el consumo de drogas, independientemente de si dichas drogas han sido analizadas con tiras reactivas de fentanilo. VDH no hace ninguna representación o garantía respecto a este producto y no asume responsabilidad alguna por la precisión de las tiras reactivas o la forma en que un destinatario las utiliza.

**NÚMERO DE LA LÍNEA DIRECTA NEVER USE ALONE**

1-800-484-3731

Never Use Alone es una línea de ayuda confidencial y libre de juicios para mantenerte seguro mientras usas drogas solo. Se te pedirá tu nombre, ubicación y el número telefónico de donde llamas. Un operador permanecerá en línea contigo mientras consumes. Si dejas de responder después de consumir, el operador notificará a los servicios de emergencia de una “persona que no responde” en tu ubicación.

**NÚMERO DE LA LÍNEA NACIONAL DE AYUDA DE SAMHSA**

1-800-622-HELP (4357)

La Línea Nacional de Ayuda de SAMHSA es un servicio confidencial, gratuito, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, en inglés y español, para personas y familias que enfrentan trastornos mentales o de uso de sustancias.

**DÓNDE RECIBIR NALOXONA**

<https://www.vdh.virginia.gov/local-health-districts/>

Muchos distritos de salud y juntas de servicios comunitarios distribuyen naloxona en los eventos de capacitación del programa REVIVE!, durante las horas de consulta sin cita previa y en otros eventos comunitarios. Contacta al departamento de salud o la junta de servicios comunitarios de tu área para obtener más información.