

ІМУНІЗАЦІЯ ВІД РЕСПІРАТОРНОГО ВІРУСУ

Вакцини проти респіраторних захворювань допомагають захиститися від тяжкого перебігу хвороби, госпіталізації та смерті.



ВАКЦИНА	ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВАКЦИНУ	ХТО МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ	КОЛИ ОТРИМАТИ	ДЕ ОТРИМАТИ
ВАКЦИНА ПРОТИ ГРИПУ	Вакцина для захисту від поширених вірусів грипу.	Усім людям віком від шести місяців. Деяким дітям може знадобитися кілька доз.	Щороку. Найкращими місяцями для отримання вакцини проти грипу є вересень і жовтень, однак вакцина все ще може бути корисною, поки вірус грипу продовжує циркулювати.	Відділи охорони здоров'я, аптеки та медичні заклади. Знайдіть пункт вакцинації на https://www.vdh.virginia.gov/immunization/provider-locator/
ВАКЦИНА ПРОТИ COVID-19	Вакцина для захисту від варіантів COVID-19, які, як очікується, будуть найпоширенішими.	Усім людям віком від шести місяців. Деяким людям (дітям, особам з ослабленою імунною системою, літнім людям) може бути рекомендовано отримати кілька доз.	Коли оновлена вакцина проти COVID-19 стане доступною (зазвичай восени). Якщо ви нещодавно перехворіли на COVID-19, ймовірно, у вас є імунітет після інфекції, і ви можете розглянути можливість почекати три місяці після хвороби перед вакцинацією. Проконсультуйтеся з вашим медичним працівником, щоб визначити, що найкраще для вашої ситуації.	Відділи охорони здоров'я, аптеки та медичні заклади. Знайдіть пункт вакцинації на https://www.vdh.virginia.gov/immunization/provider-locator/
ВАКЦИНА ПРОТИ РЕСПІРАТОРНО-СИНЦИТІАЛЬНОГО ВІРУСУ (RSV) ДЛЯ ЛІТНИХ ЛЮДЕЙ	Одноразова вакцина для літніх людей запобігає тяжкому перебігу RSV.	- Усі дорослі віком 75 років і старші. - Дорослі віком 50–74 років із підвищеним ризиком тяжкого перебігу хвороби.	Найкращими місяцями для отримання є вересень і жовтень, однак її можна отримати з вересня по березень.	Відділи охорони здоров'я, аптеки та медичні заклади.
ВАКЦИНА ПРОТИ РЕСПІРАТОРНО-СИНЦИТІАЛЬНОГО ВІРУСУ (RSV) ДЛЯ ВАГІТНИХ ЖІНОК (Abrysvo)	Одноразова вакцина для захисту немовлят від тяжкого перебігу RSV шляхом передачі захисту (антитіл) від матері до дитини.	Жінки, які перебувають на 32–36 тижні вагітності з вересня по січень і які раніше не отримували вакцину від RSV під час вагітності.	З вересня по січень.	Відділи охорони здоров'я, аптеки та медичні заклади.
ІМУНІЗАЦІЯ ПРОТИ РЕСПІРАТОРНО-СИНЦИТІАЛЬНОГО ВІРУСУ (RSV) АНТИТІЛАМИ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ	Імунізація антитілами (не вакцина), що забезпечує захист (антитіла) для захисту немовлят від тяжкого перебігу RSV.	- Усі немовлята віком до 8 місяців, якщо мати не отримувала вакцину від RSV під час вагітності. - Діти віком 8–19 місяців, які мають підвищений ризик тяжкого перебігу хвороби.	Якомога раніше після народження з жовтня по березень.	Відділи охорони здоров'я, медичні заклади та пологові будинки.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Зателефонуйте до вашої аптеки, щоб уточнити наявність вакцини та вік, у якому вони проводять щеплення. У багатьох випадках ці вакцини можна вводити одночасно. Якщо у вас є запитання, зверніться до медичного працівника, фармацевта або до місцевого відділу охорони здоров'я [vdh.virginia.gov/health-department-locator](https://www.vdh.virginia.gov/health-department-locator).

Відвідайте вебсторінку VDH про респіраторні захворювання: [vdh.virginia.gov/epidemiology/respiratory-diseases-in-virginia/](https://www.vdh.virginia.gov/epidemiology/respiratory-diseases-in-virginia/)

Останнє оновлення 10/2025