

توصیه‌های واکسیناسیون در برابر ویروس‌های تنفسی

واکسین‌های بیماری‌های تنفسی به محافظت در برابر بیماری شدید، بستری‌شدن در شفاخانه و مرگ کمک می‌کنند



کووید-19	ویروس سین‌سیشیال تنفسی (RSV)	انفلونزا (زکام)	
تمام اطفال خردسال 6 تا 23 ماهه و اطفال 2 تا 18 ساله در گروه‌های خاص در معرض خطر یا در صورت تمایل	تمام نوزادان زیر 8 ماه، در صورتی که در جریان بارداری از واکسین RSV محافظت دریافت نکرده باشند، و اطفال 8 تا 19 ماهه در گروه‌های خاص در معرض خطر	واکسین سالانه انفلونزا برای تمام اطفال 6 ماهه و بالاتر	اطفال و نوجوانان (0 تا 18 سال)
واکسین سالانه به‌روزشده کووید-19	یک دوز واکسین RSV در اولین بارداری واجد شرایط، در صورتی که سن بارداری 32 تا 36 هفته باشد؛ این واکسین باید بین 1 سپتامبر و 1 مارچ تطبیق شود	واکسین سالانه انفلونزا (از واکسین انفلونزا به شکل اسپری بینی استفاده نشود)	بارداری
واکسین سالانه به‌روزشده کووید-19	یک دوز واکسین RSV برای بزرگسالان 50 تا 74 ساله که در معرض خطر بیشتر ابتلا به بیماری شدید ناشی از RSV قرار دارند	واکسین سالانه انفلونزا برای تمام بزرگسالان 19 ساله و بالاتر	بزرگسالان 19 تا 64 سال
واکسین سالانه به‌روزشده کووید-19 برای بزرگسالان 65 ساله و بالاتر، و سپس دوز دوم 6 ماه بعد برای تقویت محافظت	یک دوز واکسین RSV برای بزرگسالان 50 تا 74 ساله که در معرض خطر بیشتر قرار دارند و برای تمام بزرگسالان 75 ساله و بالاتر توصیه می‌شود	واکسین سالانه انفلونزا برای تمام بزرگسالان؛ در صورت امکان، برای افراد 65 ساله و بالاتر از واکسین تقویت‌شده انفلونزا (دوز بلند، دارای ادجوانت، نوترکیب یا mRNA) استفاده شود	بزرگسالان 65 ساله و بالاتر
واکسین سالانه به‌روزشده کووید-19 برای افراد 6 ماهه و بالاتر	یک دوز واکسین RSV برای افراد 18 ساله و بالاتر؛ برای افراد زیر 18 سال، تطبیق واکسین باید بر اساس تصمیم‌گیری مشترک با داکتر انجام شود	واکسین سالانه انفلونزا برای افراد 6 ماهه و بالاتر (از واکسین انفلونزا به شکل اسپری بینی استفاده نشود)	افراد دارای سیستم معافیتی ضعیف
واکسین سالانه به‌روزشده کووید-19	توصیه‌های واکسین RSV را بر اساس سن و میزان خطر دنبال کنید	واکسین سالانه انفلونزا	کارکنان صحت

آخرین به‌روزرسانی: 09/26

برای اطمینان از موجودیت واکسین و آگاهی از گروه‌های سنی که می‌توانند واکسین دریافت کنند، با دواخانه یا ارائه‌دهنده خدمات صحت خود تماس بگیرید. در بسیاری موارد، این واکسین‌ها را می‌توان هم‌زمان تطبیق کرد. اگر سوالی دارید، با ارائه‌دهنده خدمات صحت، دوا ساز یا ریاست صحت محل زندگی خود مشوره کنید.

